

樂學網 內外科第一次隨堂小考

- 01.急診現有四位病患就診，評估結果分別為(1)關節脫臼(2)頸椎損傷(3)神經質(4)尺骨開放性骨折，您依檢傷分類的結果判斷其優先診治順序為：
(A)(4)(2)(1)(3) (B)(2)(4)(1)(3) (C)(1)(4)(2)(3) (D)(3)(4)(1)(2)
- 02.有關中毒的敘述，下列何者正確？(A)一氧化碳中毒會出現組織缺氧 (B)強酸對食道造成的傷害比強鹼嚴重 (C)臘腸中毒會嚴重影響周邊神經系統的功能 (D)眼鏡蛇咬傷是一種出血性毒素中毒
- 03.有關心因性休克的臨床表徵，下列何者正確？(A)中心靜脈壓 < 3 cmH₂O (B)肺部聽診時有爆裂音 (C)尿液排出量 < 30 c.c./小時 (D)血壓上升
- 04.何項不是手術前給藥的目的？(A)減輕焦慮(B)減少咽喉的分泌物 (C)增強麻醉藥的藥效 (D)控制不適症狀
- 05.何項不是手術後 24~48 小時內的早期合併症？(A)肺擴張不全(B)傷口化膿 (C)缺血性休克 (D)沉積性肺炎
- 06.下列有關手術前衛教之敘述，何者正確？(A)深呼吸運動強調胸部擴張的胸式呼吸法 (B)深呼吸運動最好每日早、晚各做一次 (C)咳嗽運動前應先做深呼吸運動 (D)翻身運動可於手術後 24 小時後再進行
- 07.當護理人員照顧的癌症病人使用 Bleomycin 化學藥物治療時，應該注意觀察並監測易引起下列何項毒性反應？(A)小腦功能異常 (B)肺纖維化 (C)出血性膀胱炎 (D)心臟毒性
- 08.有關部分乳房切除術的護理指導，下列何者正確？(A)向個案保證手術時間不會太長，也不會影響外觀 (B)手術時僅切除部分腋下淋巴結，不會影響淋巴液的回流 (C)手術後即刻鼓勵個案執行手臂運動，可促進淋巴引流 (D)告訴個案復健運動時要多忍耐疼痛，以免止痛藥影響傷口癒合
- 09.癌症末期病人發生惡病質(cachexia)的原因，下列何者錯誤？(A)身體代謝需要下降 (B)腫瘤細胞競爭營(C)葡萄糖代謝受損 (D)脂質代謝改變
- 10.燒傷病患的動脈血液氣體分析數值為 pH：7.30，PaCO₂：75 mmHg，HCO₃⁻：32mEq/L，是屬於下列何種酸中毒？(A)未代償性代謝性酸中毒(B)部分代償性代謝性酸中毒(C)未代償性呼吸性酸中毒(D)部分代償性呼吸性酸中毒
- 11.有關血鈉過低患者的護理措施，下列何者錯誤？(A)鼓勵多飲水 (B)補充 3% 食鹽水，滴注速度宜緩慢 (C)輸液補充鈉離子時，宜小心體液過量現象 (D)教導病人攝取發酵麵粉製品
- 12.下列那些現象是血鉀過低的症狀？(1)肌腱反射的降低(2)腹脹(3)T 波呈現尖窄、QRS 波變寬(4)少尿：(A)(1)(2) (B)(1)(3) (C)(1)(4) (D)(2)(4)

13. 82 歲謝伯母，因出現站立時頭昏心悸現象而入院求診，主訴常覺疲勞口渴，觀察其外觀，嘴唇乾燥，皮膚乾皺，尿液減少，血清滲透壓為 280 mOsm/kg，此狀況最可能的為以下那項電解質失衡狀態？
(A)單純性水缺乏 (B)單純性鈉缺乏 (C)水與鈉皆缺乏 (D)水與鉀皆缺乏
14. 燒傷病人進行水療過程中，造成的電解質不平衡，何者最常見？
(A)高血鈉 (B)低血鈉 (C)高血鉀 (D)低血鉀
15. 許先生，50 歲，體重 65 公斤，燙傷面積占 30%體表面積，依帕克蘭公式 (Parkland 或 Baxter formula) 計算，第 1 個 24 小時給予許先生的輸液，下列何者正確？(A)乳酸林格氏液 7,800 c.c. (B)乳酸林格氏液 3,900c.c. (C)乳酸林格氏液 2,925c.c. + 膠體 975c.c. + 5%葡萄糖水 2,000c.c. (D)生理食鹽水 1,950 c.c. + 膠體 1,950c.c. + 5%葡萄糖水 2,000c.c.
16. 有關燒傷患者穿著彈性衣之敘述，下列何者正確？(1)因各部位壓力不同，彈性衣須量身訂製(2)傷口尚未癒合時，即應開始穿著彈性衣(3)彈性衣須穿至疤痕完全成熟時才可停止(4)每天穿著彈性衣 6-8 小時效果較佳：(A)(1)(2) (B)(3)(4) (C)(1)(3) (D)(2)(4)
17. 有關腰椎穿刺檢查的注意事項，下列何者正確？(A)可用來檢查顱內壓升高程度 (B)針穿過硬膜時，若有些微疼痛，表示長針位置錯誤，應立即拔出 (C)第一個收集的腦脊髓液試管檢體，是用來檢測是否含血 (D)穿刺後，鼓勵多喝水，以減輕頭痛
18. 下列何者為巴金森氏症之主要病灶位置？(A)大腦灰質 (B)大腦白質 (C)大腦基底核 (D)延腦黑質
19. 有關使用藥物控制癲癇發作之敘述，下列何者錯誤？(A)開始治療時，單獨使用一種高劑量抗痙攣藥物，比同時使用多種低劑量藥物有效 (B)抗痙攣藥物在覺得快發作時服用是無效的 (C)注意服用 Tridione 控制小發作時，是否出現夜盲症狀 (D)注意使用 Diamox 控制局部或泛發性發作時，是否出現眼球震顫症狀
20. 有關顱內腫瘤之敘述，下列何者正確？(A)病患之頭痛常出現在顱部 (B)病程晚期才會因視乳頭水腫而有視力變差現象 (C)腫瘤長在大腦半球之病患，常出現局部性或泛發性之抽搐 (D)多形膠母神經細胞瘤之病患，常有 5 年之存活期

解答：

- 1(B)、2(A)、3(C)、4(C)、5(B)、6(C)、7(B)、8(C)、9(A)、10(D)、11(A)、12(A)、13(C)、14(B)、15(A)、16(C)、17(D)、18(C)、19(D)、20(C)