

等 別：高等考試  
類 科：護理師  
科 目：產兒科護理學  
考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。  
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。  
(三)禁止使用電子計算器。

- 有關產科護理理念與原則，下列何者不適當？  
(A)提供以孕產婦為中心的護理 (B)提供孕產婦以家庭為中心的護理  
(C)提供以機構產科常規為主軸的照護 (D)提供以文化取向的護理
- 下列何者不符合我國優生保健法所規範的依其自願，施行人工流產？  
(A)本人或其配偶之五等親以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病者  
(B)有醫學上理由，足以認定胎兒有畸形發育之虞者  
(C)因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者  
(D)因懷孕或生產將影響其心理健康化家庭生活者
- 初乳是由乳房所分泌之淡透明且具黏性之液體，大約何時開始分泌？  
(A)懷孕 3 個月 (B)懷孕 5~6 個月 (C)生產後立即 (D)生產後 2~3 天
- 潘女士孕產史為 G<sub>2</sub>P<sub>1</sub>，目前懷孕 35 週，因陰道出血而至醫院進行無壓力試驗 (NST) 的檢查，其結果為：每 20 分鐘有 5 次胎動，且胎動時胎心率增加約 20 bpm，持續約 30 秒，請問下列 NST 之判讀結果，何者正確？  
(A)胎兒有缺氧現象，但胎盤功能正常 (B)胎兒健康狀況良好，胎盤功能正常  
(C)無法由檢查結果判斷胎兒狀況 (D)胎兒有缺氧的擔憂，胎盤功能不好
- 王女士經常夢見胎兒缺手缺腳的異常，此為妊娠那一期常見的心理反應？  
(A)妊娠第一期 (B)妊娠第二期 (C)妊娠第三期 (D)計畫懷孕期
- 張女士，曾產下死胎，目前懷孕 15 週，請問醫師最可能建議她接受何種檢查，以排除胎兒神經管缺陷的可能？  
(A)超音波檢查 (B)絨毛膜取樣 (C)羊膜穿刺術 (D)臍帶穿刺術
- 下列那一些胎兒組織是由外胚層發育而來？  
(A)膀胱、尿道 (B)紅血球 (C)神經組織 (D)所有骨骼肌
- 下列那些措施可協助母親成功哺餵母乳？①建立哺育母乳支持團體 ②提供嬰兒葡萄糖水 ③教導母親如何維持泌乳 ④實施 12 小時母嬰同室 ⑤鼓勵依寶寶需求哺餵母乳 ⑥協助產婦產後 24 小時後哺餵母乳 ⑦提供嬰兒安撫奶嘴  
(A)①③⑤ (B)②④⑥ (C)①⑤⑦ (D)③④⑥
- 林女士 35 歲，懷孕 14 週，其母血唐氏症篩檢危險比值高於多少時，應建議進一步檢查？  
(A) 1 : 270 (B) 1 : 350 (C) 1 : 450 (D) 1 : 1000
- 王女士妊娠 16 週，護理指導主要的項目為：  
(A)胎兒的發育及如何預防噁心嘔吐  
(B)胎兒的發育、個人衛生保健及營養需求指導  
(C)子癇前症的危險徵兆、呼吸的技巧及放鬆的技巧  
(D)準備嬰兒出生後的物品及如何準備到醫院生產

- 11 張女士懷孕 40 週，主訴最近幾天胎動減少，入院做無壓力試驗，執行 10 分鐘後，從胎兒監視器記錄呈現胎動 1 次，極小變異性，護理師此時最合宜之措施為何？  
(A)立即入院引產  
(B)正常反應，繼續觀察  
(C)胎兒可能睡覺中，可以嘗試吵醒胎兒後再檢查  
(D)安排下床散步
- 12 張女士第二胎，子宮頸開 9 公分，胎頭高度 +1，有便意感，此時護理師最適宜之措施為：  
(A)教導用力動作  
(B)教導呼吸方式  
(C)教導按摩方式  
(D)不須特別處理，繼續觀察
- 13 孕婦在待產時，突然感覺腹部一陣劇烈陣痛，接著宮縮停止，而且無法測到胎心音。此情況可能是發生了下列何種情形？  
(A)低張性子宮收縮 (B)早期破水 (C)子宮破裂 (D)羊水栓塞
- 14 謝女士第一胎，子宮頸開 5 公分，主訴已經待產 10 小時，不想再等待下去，有關此階段的描述，下列何者正確？  
(A)此階段為活動期，平均每半小時會進展 1 公分  
(B)此階段為潛伏期，平均 10 小時是正常的產程進展時間  
(C)此階段為活動期，平均每 1 小時進展 1 公分  
(D)此階段為過渡期，平均每 1 小時子宮頸擴張 2 公分
- 15 待產階段，護理師避免讓待產婦固定平躺，其理由為平躺最有可能造成下列何種情形？  
(A)降低胎盤血流 (B)增加血壓  
(C)阻礙恥骨聯合活動 (D)增加重力，延長產程
- 16 有關剖腹產的敘述，下列何者錯誤？  
(A)胎兒窘迫是緊急剖腹產的適應症 (B)剖腹產後，以後生產均需採剖腹生產  
(C)子宮直式切開法，比較容易出血 (D)子宮下段橫式切開法，手術後合併症較少
- 17 下列何者不屬於產後「BUBBLEHE」的護理評估項目？  
(A)膀胱功能 (B)腸胃道功能  
(C)子宮復舊及會陰傷口 (D)身體外觀
- 18 有關子宮收縮的敘述，下列何者正確？  
(A)子宮的收縮，是由子宮下段開始向子宮底方向收縮  
(B)子宮上三分之二為主動收縮，可有效將胎兒往下推擠  
(C)子宮下三分之一為主動收縮，可有效將胎兒往下推擠  
(D)子宮下段收縮強度較子宮上段強
- 19 下列產後憂鬱症 (postpartum depression) 的敘述，何者錯誤？  
(A)常發生於產後 4 週到 5 個月之間 (B)可能是產後雌性素、黃體素突然上升所導致  
(C)食慾異常、睡眠困擾是常見的症狀 (D)可能是產後面臨經濟與孩子照顧問題所導致
- 20 陳女士 G<sub>1</sub>P<sub>1</sub>，母嬰同室，產後第二天於餵奶後打開包布，檢查及觸摸寶寶的四肢，下列何者為最合適的護理措施？  
(A)告知個案天冷寶寶會著涼，最好不要打開包布  
(B)告知個案寶寶此時最需要的是擁抱  
(C)鼓勵個案觸摸寶寶，這是熟識寶寶的方法  
(D)告知個案儘量不要觸摸寶寶，以免寶寶受到感染

- 21 護理剛接受剖腹產返室的產婦，下列何項護理措施不合宜？  
(A)測量血壓 (B)做產後完整衛教  
(C)觀察尿中有無血色 (D)檢查傷口情形
- 22 當一位足月待產婦出現下列何種徵兆時，應在 24 小時內引產？  
(A)現血 (B)破水 (C)陣痛 (D)疲倦
- 23 李女士第一胎自然生產，準備哺餵母乳，護理師欲協助李女士哺乳成功，下列方法何者不恰當？  
(A)協助儘早開始哺餵母乳 (B)不限制餵奶的時間及次數  
(C)指導正確的哺乳技巧 (D)晚上可以用配方奶補充餵食新生兒
- 24 母親具有下列何種疾病或情況時，仍可哺餵母乳？  
(A) C 型肝炎帶原 (B)具傳染力的結核病  
(C)愛滋病 (AIDS) (D)使用抗癌症藥物
- 25 下列何種賀爾蒙最初由卵巢分泌，至妊娠 8 週後由胎盤製造，其主要作用可鬆弛平滑肌，而防止子宮收縮引起的自發性流產？  
(A)雌性素 (B)黃體素 (C)泌乳素 (D)人類絨毛膜促性腺素
- 26 有關母乳的敘述，下列何者錯誤？  
(A)初乳的高蛋白對嬰兒穩定血糖的作用比餵糖水更佳  
(B)儘早並經常地哺餵母乳可減少黃疸的發生  
(C)母乳的維生素 D 比配方奶粉低  
(D)母乳中的乳清蛋白比配方奶粉高
- 27 孕婦有妊娠糖尿病時，護理師應優先注意新生兒的下列何種症狀？  
(A)黃疸 (B)低血糖 (C)貧血 (D)體溫過低
- 28 新生兒出生後要適應子宮外的環境，首先要建立呼吸的功能，下列何者不是影響新生兒第一次呼吸的因素？  
(A)肺微血管彈性 (B)肺黏液稠度  
(C)肺容量彈性 (D)製造肺泡表面張力素的能力
- 29 有關前置胎盤孕婦的護理措施，下列何者不適當？  
(A)限制活動 (B)臥床休息  
(C)在生產之前給予清潔灌腸 (D)觀察和記錄出血情形
- 30 丁小妹，出生後第 10 天，母親慌張的來電表示：「丁小妹舌頭及口腔兩頰黏膜出現白白的東西無法輕易刮除，拒絕吸奶，怎麼辦？」下列何者為護理師最適當的回應？  
(A)可能是奶垢，請母親別擔心，用棉棒或紗布沾水去除即可  
(B)此現象可能是嬰兒暫時性過敏反應，請母親再嘗試哺餵 2 天，觀察看看  
(C)此為自限性疾病，衛教加強餵食用品的清潔與消毒，情況自然會有改善  
(D)可能為鵝口瘡，應立即就醫診治，配合藥物治療
- 31 陳女士，29 歲，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，懷孕 30 週，腹部有繃緊不適感，下列的護理指導內容何者較為合適？  
(A)妳的症狀有可能是早產症狀，請妳趕快到醫院來  
(B)若是腹部有繃緊的感覺又加上胎動明顯時，妳就應該到醫院來  
(C)請先臥床休息並觀察繃緊次數，若 1 小時內有 4 次或以上，應即就醫  
(D)這是屬於正常的孕期假陣痛現象，只要觀察即可，不需要特別處理

情況：林女士，將行腹腔鏡手術切除子宮肌瘤。請依此回答下列第 32 題至第 33 題。

- 32 下列術前與術中的照護，何者適當？  
(A)手術前只需以 ducolax 塞劑做腸道準備  
(B)手術前皮膚準備應避開肚臍與其周圍 5 公分皮膚  
(C)手術時需採頭低腳高之膀胱截石姿勢  
(D)手術時應輸注大量液體，以利顯影劑排出體外
- 33 林女士術後主訴肩膀疼痛，下列護理師的解釋何者正確？  
(A)因手術時肩膀需特別固定，而造成壓迫所致  
(B)因手術時打入腹腔的二氧化碳刺激膈神經所致  
(C)因手術時內視鏡頭刺激肋間神經所造成  
(D)手術時因心肌受到刺激所造成的反射痛
- 34 卵巢癌早期不易被發現，晚期因壓迫盆腔器官才容易出現症狀，其臨床表徵經常包括下列何者？  
①腹脹 ②腹水 ③性交後出血 ④月經量多 ⑤頻尿 ⑥陰道分泌物增加  
(A)①②⑤ (B)①③⑥ (C)③④⑤ (D)④⑤⑥
- 35 有關強暴的敘述，下列何者正確？  
(A)夫妻間沒有強暴之問題  
(B)施暴者是性衝動較活躍者  
(C)施暴者多有心智上的疾病或障礙以致無法控制行為  
(D)施暴者來自各種不同的社會背景，且多數並沒有精神疾病的診斷
- 36 郭先生的精液分析結果如下：精液量約 4 c.c.，精蟲數目 300 萬/c.c.，射精後 60% 的精蟲仍具活動力，正常型態的精蟲為 50%。其結果如何解釋？  
(A)精蟲數目太少 (B)精蟲活動力略差  
(C)異常型態的精蟲太多不易受精 (D)結果一切正常

情況：李女士 G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，32 歲，懷孕 25 週，因產前檢查尿糖（+），故進一步安排口服葡萄糖耐受試驗（OGTT）。請依此回答下列第 37 題至第 38 題。

- 37 下列有關其檢查重點及護理要項之敘述，何者正確？  
(A) OGTT 的檢測通常是在口服 50 公克葡萄糖水 1 小時後血糖值超過 140 mg% 時才進行  
(B)於口服葡萄糖水後 3 小時檢測其血糖值，若超過 110 mg%，則可確立其為妊娠糖尿病  
(C)若李女士於孕前已罹患糖尿病，則應在妊娠 12 週進行 OGTT 測試，以儘早確立診斷  
(D) OGTT 檢測對胎兒容易造成缺氧及胰島素活性增加的現象，檢查前宜先對李女士作說明
- 38 李女士經檢查確認為妊娠糖尿病，她詢問護理師接受糖尿病治療是否對胎兒有所影響，下列何者為較合宜的回答？  
(A)「胰島素雖會影響胎兒成長，但是控制血糖穩定更重要，否則合併症將更嚴重」  
(B)「接受胰島素治療不會導致胎兒畸形，血糖控制不良反而容易導致母體與胎兒健康問題」  
(C)「胰島素有致畸胎的可能，但是醫師會定時幫您安排胎兒檢查，以預防胎兒畸形發生」  
(D)「胰島素只會使胎兒有體重增加的情形，沒有其他不良影響，請不要擔心」
- 39 母嬰同室時，下列何者為預防新生兒感染的最重要原則？  
(A)母嬰同室時，新生兒會接觸較多的人，最好不要回嬰兒室照護，以避免交互感染  
(B)指導讓新生兒吸吮母親乳房前，需先用清水或酒精棉球擦拭乳頭，以避免交互感染  
(C)加強宣導與新生兒接觸之父母與家人，正確地洗手及洗手五時機觀念  
(D)宣導與新生兒接觸之父母與家人，接觸新生兒時，需穿著乾淨衣物或隔離衣
- 40 對於輕微的產後陰道血腫，在產後 12 小時所給予的護理措施，下列敘述何者最適當？  
(A)依醫囑給予止痛劑 (B)給予會陰部冰敷  
(C)延遲下床活動時間，以避免陰部摩擦 (D)依醫囑注射止血劑

- 41 依據 101 年 8 月 8 日修正的兒童及少年福利與權益保障法，當護理師知悉兒童施用毒品時，應於幾小時內向主管機關通報？  
(A) 24 (B) 48 (C) 72 (D) 96
- 42 有關兒童生理發展之敘述，下列何者錯誤？  
(A) 新生兒時頭圍大於胸圍 2~3 公分 (B) 前囟門在出生後 12~18 個月閉合  
(C) 滿週歲時體重是出生體重的 3 倍 (D) 滿 4 歲時身高是出生身高的 4 倍
- 43 依據皮亞傑 (Piaget) 的認知發展理論，8 歲的小威對死亡的概念，下列何者正確？  
(A) 沒有死亡的概念，但對失落有感覺、反應  
(B) 認為死亡就如同睡覺一樣，是暫時的分離  
(C) 認為死亡是不可逆轉的，每一個人都會死亡  
(D) 死亡擬人化，認為躲起來，就不會被死神抓到
- 44 信宏，出生時體重 3500 公克，身長 52 公分，目前剛滿 1 歲，根據最近評估所得之下列資料，何者顯示信宏的生長發育有問題？  
(A) 身高 78 公分 (B) 體重 8500 公克  
(C) 已長出上下中央及側門齒 (D) 胸圍與頭圍皆為 48 公分
- 45 執行 1 歲以下嬰兒急救時，應從那個部位檢查脈搏較合適？  
(A) 膝臑動脈 (B) 足背動脈 (C) 橈動脈 (D) 肱動脈
- 46 小波，11 個月大，吞食果泥時不慎噎到，呈現呼吸困難臉色發黑現象，下列護理措施何者正確？  
(A) 立即替小波捏鼻，並給予口對口吹二口氣  
(B) 以哈姆立克法在其橫膈膜下之腹部，推擠 5 次  
(C) 將小波抱起放在床上，以食指及中指壓胸骨 5 次  
(D) 讓小波頭低於軀幹，用力在背後肩胛骨間拍擊 5 下及以兩手指壓胸 5 次
- 47 那一年齡層的兒童，容易誤解自己生病住院的原因，而出現罪惡及恐懼的感覺？  
(A) 青少年期 (B) 學齡期 (C) 學齡前期 (D) 幼兒期
- 48 護理師需要對下列那一位個案做進一步的評估？  
(A) 1 歲的小英，只能獨自站立 2 秒鐘  
(B) 2 歲的大明，除有意義叫爸媽外，只會一個單字  
(C) 6 歲的小華，仍會吸吮大拇指，且偶爾尿床  
(D) 10 歲的小民告訴媽媽，如果爸媽再吵架，他就要離家出走
- 49 收集兒童的尿液標本時，下列何者不適當？  
(A) 無法合作的嬰幼兒，可使用小兒集尿袋留取尿液標本  
(B) 30 分鐘內需將尿液標本送至檢驗室  
(C) 使用小兒集尿袋時，每小時需檢查 1 次  
(D) 年齡較大且願意合作的兒童可採用留取中段尿的尿液標本
- 50 13 歲的阿文因白血病住院，下列護理措施何者最不適當？  
(A) 進其房門時需先敲敲門 (B) 阿文病情穩定時可鼓勵他打電話找同學聊天  
(C) 徵求阿文的同意，鼓勵同學來探訪 (D) 為避免阿文擔心，病情解釋不宜過於詳細
- 51 娟娟，16 歲，罹患全身性紅斑狼瘡 (SLE)，此慢性疾病現階段對她造成最大的影響為：  
(A) 不能上體育課及與同學參與體能活動、比賽而產生自卑  
(B) 身體外觀會因為藥物的副作用而改變，進而影響自我心像  
(C) 經常需要接受治療，擔心請假過多影響學業  
(D) 擔心會影響日後的生育能力

- 52 預防早產兒顱內壓升高造成顱內出血（intracranial hemorrhage）的護理措施，下列何者不適當？
- (A) 疼痛治療後，安撫早產兒，減少其哭泣不安
  - (B) 避免突然將早產兒頭轉向一側，而身體姿勢未隨之轉動
  - (C) 隨早產兒的需求調整給氧濃度，維持其體內適當的氧氣濃度
  - (D) 靜脈輸入低張溶液，補充體液時，需快速輸注
- 53 有關兒童慢性病的描述，下列何者正確？
- (A) 慢性病的特徵是需要很長的時間才可治癒
  - (B) 以正常化的概念，提供慢性病兒童以家庭為中心的護理
  - (C) 慢性病是指 1 年內有超過 1 個月的時間受疾病症狀干擾日常生活
  - (D) 慢性病的長期管理主要是依賴專業人員協助
- 54 面對剛經歷喪子之痛的父母親，下列何項護理措施最適當？
- (A) 安慰父母親：「你應該很欣慰，你的孩子現在已經不會感到疼痛了。」
  - (B) 接納父母親的情緒反應，靜靜的陪伴在父母親身邊
  - (C) 提醒父母，趕快幫孩子進行接下來的儀式
  - (D) 趕快離開現場，以避免尷尬
- 55 有關瀕死兒童之護理，下列敘述何者錯誤？
- (A) 病童主述疼痛時，應給予非鴉片類止痛劑，以防呼吸抑制
  - (B) 病童體力較差、顯得疲倦時，可安排安靜而不費力的活動
  - (C) 在視覺上要提供明亮的環境，以增加病童的安全感
  - (D) 與病童說話時，要清楚且語調適當，以減少病童的焦慮
- 56 給予兒童眼藥或耳藥之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 眼藥水：滴入下眼瞼結膜之內側
  - (B) 眼藥膏：由眼內角往眼外角擦抹於下眼瞼結膜上
  - (C) 耳藥滴入：3 歲以下之兒童，將耳廓往上往後輕拉
  - (D) 滴入耳藥時，協助兒童持續側躺約 10~15 分鐘
- 57 有關新生兒胎便吸入症候群之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 外觀皮膚、指甲、臍帶有胎便染色呈黃綠色
  - (B) 絕大多數發生在足月兒或過期產者
  - (C) 出生時即有呼吸急促、呼吸困難徵象
  - (D) 在胎頭與肩部娩出後，立刻給予氧氣袋加壓協助呼吸
- 58 罹患後天免疫缺乏症候群（acquired immune deficiency syndrome）的嬰兒最常見的死亡原因為何？
- (A) 卡波西斯瘤（Kaposi's sarcoma）
  - (B) 營養不良（malnutrition）
  - (C) 惡病質（cachexia）
  - (D) 卡氏肺囊蟲肺炎（pneumocystis carinii pneumonia）
- 59 有關卡介苗接種的敘述，下列何者正確？
- (A) 此疫苗是由殺死的牛型結核桿菌製成
  - (B) 新生兒不管體重多寡均需於出生 1 週內接種
  - (C) 在左上臂三角肌的中央部位採皮下注射
  - (D) 接種部位產生潰瘍時不可塗藥，讓其自然痊癒
- 60 有關嬰幼兒急性中耳炎的原因，下列何者錯誤？
- (A) 上呼吸道感染
  - (B) 歐氏管較成人短、窄且彎曲
  - (C) 腭裂尚未矯正
  - (D) 耳內淋巴組織腫大，阻塞歐氏管

- 61 早產兒接受持續性給氧治療，氧氣需經潮濕瓶濕化，下列護理師的回答，何者最恰當？  
(A)潮濕的氧氣可以促進血液循環 (B)濕氣可以促進早產兒的肺擴張  
(C)氧氣必須潮濕，以避免呼吸道黏膜太乾燥 (D)濕氣可以預防病毒性或細菌性肺炎
- 62 有關黴漿菌性肺炎 (*mycoplasma pneumonia*) 之敘述，下列何者錯誤？  
(A)大多侵犯 1~4 歲幼兒，較不容易傳染給其他家人  
(B)會出現乾咳、無痰或少量痰，痰中血球種類為單核白血球  
(C)胸部 X 光片會看到下肺葉處有斑塊狀的間質性肺炎的陰影  
(D)給予紅黴素治療 10~14 天，或 azithromycin 治療 3 天
- 63 周小妹，2 個月大，罹患先天性心臟病，有關教導媽媽居家照護注意事項，下列何者錯誤？  
(A)母乳需擠出，再給予周小妹餵食或灌食 (B)宜選擇柔軟洞口稍大的奶嘴  
(C)每次餵食時間宜超過 30 分鐘 (D)宜少量多餐，給予高熱量飲食
- 64 安安，5 個月大，出生正常且定期於健康服務中心完成嬰幼兒預防接種。現因川崎氏症 (Kawasaki disease) 第一次住院接受症狀處理及靜脈注射免疫球蛋白治療，下列的護理措施何者錯誤？  
(A)以少量多餐方式補充流質或軟質食物，並監測輸出入量，以注意是否脫水現象  
(B)急性期給予 aspirin 100 mg/kg/day 以抑制發炎及血小板凝集而造成心臟血管損傷  
(C)注意安安四肢末梢循環狀態及紅疹、水腫及脫皮，給予棉質透氣之衣物  
(D)提醒母親帶安安完成常規的疫苗接種，以增強免疫能力
- 65 凱凱，10 歲，出生檢查即發現罹患有法洛氏四重症畸形，護理評估時會發現下列何項症狀？  
(A)易產生紅血球過少的現象 (B)可能出現杵狀指 (clubbing finger)  
(C)可能合併有肺發育不全 (D)肺動脈的壓力可能會較低
- 66 有關鐮刀狀細胞貧血 (sickle cell anemia) 的處置，下列何者正確？  
(A)可使用 aspirin 止痛 (B)以冷敷方式消除肢體腫脹  
(C)以濃縮紅血球作輸血治療 (D)限制水分的攝取，以控制水腫
- 67 林小妹，9 個月，母親發現其體重沒有增加的現象，到醫院抽血檢查林小妹血紅素為 8 gm/dL，血比容為 30%，血清鐵質為 28 µg/dL，診斷為缺鐵性貧血，下列敘述何者正確？  
(A)缺鐵性貧血屬於體染色體隱性遺傳疾病  
(B)鐵劑最好在飯前 1 小時與含維生素 C 之果汁一起服用  
(C)停止餵母乳，改喝加鐵之配方奶  
(D)肌肉注射鐵劑後須揉搓注射部位以助吸收
- 68 5 歲的吳小妹為急性淋巴性白血病 (acute lymphoid leukemia, ALL) 患者，目前接受化學治療中，其血液檢驗值：白血球為  $2,000/\text{mm}^3$ ；成熟嗜中性白血球 (segment) 為 15%；不成熟嗜中性白血球 (band) 為 1%；淋巴球 (lymphocytes) 為 70%；單核球 (monocytes) 為 14%，吳小妹的絕對嗜中性白血球值 (ANC) 為多少？  
(A)  $150/\text{mm}^3$  (B)  $320/\text{mm}^3$  (C)  $700/\text{mm}^3$  (D)  $1,400/\text{mm}^3$
- 69 有關第一型糖尿病病童使用採血針檢驗血糖的護理措施，下列敘述何者較不恰當？  
(A)採血前先將手指浸泡冰水數秒，以減少採血時的疼痛感  
(B)宜在手指指腹側邊採血，因其富含血管且含較少的神經末梢  
(C)採血後應稍加壓止血，但避免按摩該部位  
(D)勿將手指置於桌面扎針，以免刺入手指過深
- 70 急性腎衰竭 (acute renal failure) 兒童出現下列那一個徵象時，需懷疑是血鉀過高？  
(A)頭痛 (B)心悸 (C)無尿 (D)便秘

- 71 小鑫，7 個月，罹患苯酮尿症，有關飲食的護理指導，下列敘述何者錯誤？  
(A) 飲食治療目的在預防腎臟功能病變  
(B) 餵食特殊的牛奶配方，如 Lofenalac 和 Phenyl-Free  
(C) 飲食控制時間愈長愈好，至少持續至學齡期  
(D) 應避免攝取含魚、肉、蛋、牛奶、堅果、豆類等副食品
- 72 甲狀腺機能亢進（hyperthyroidism）好發於下列何者？  
(A) 青春期女性 (B) 青春期男性 (C) 學齡前期女童 (D) 學齡前期男童
- 73 徐小弟，6 歲，主訴頭痛及視力模糊，於急診室測量血壓為 150/100 mmHg，入院診斷為急性腎絲球腎炎（AGN），下列護理處置何者正確？  
(A) 急性期必須臥床休息或於床上活動 (B) 鼓勵攝取高鉀食物並限制飲水  
(C) 觀察病童是否因高血容積而造成肺水腫 (D) 評估病童的膽固醇及三酸甘油脂是否上升
- 74 亮亮，2 歲半，體重 14 公斤，無法正常由口進食；為他插鼻胃管（N-G tube）時，下列敘述何者正確？  
(A) 鼻胃管的尺寸應選擇 10~12 Fr.  
(B) 插管時，協助亮亮側躺向右側  
(C) 過程中若有咳嗽、噎到、發紺是正常的現象  
(D) 由鼻插入至胃的長度可由鼻尖經耳垂，連至肚臍來測量
- 75 小琪罹患粥樣瀉（celiac disease），護理師應指導母親避免給予小琪下列那種食物？  
(A) 米飯 (B) 麵包 (C) 豆漿 (D) 玉米
- 76 小蘭，6 個月大，此次住院是因水腦症而置入右側的腦室腹膜分流管（ventriculoperitoneal shunt, V-P shunt），今日病況穩定準備出院，護理師給予父母出院護理指導，下列敘述何項不適當？  
(A) 觀察小蘭的傷口周圍是否有紅腫現象 (B) 觀察小蘭的前凶門是否膨出  
(C) 每日由同一人測量小蘭的頭圍 (D) 教導父母協助小蘭採右側臥，以利引流
- 77 兒童罹患細菌性腦膜炎，下列何者為布魯辛斯基氏徵象（Brudzinski's sign）的陽性反應？  
(A) 平躺時用手托高頭部，將其頸部迅速屈曲，病童會感到疼痛，膝部因而屈曲  
(B) 平躺時，雙手將大腿托高，再快速伸展小腿，檢查者感到阻力，病童感到疼痛  
(C) 用手指沿著病童腳跟由外側往上向內劃線，會出現大拇指向上翹，其餘四趾張開成扇形  
(D) 將病童的頭部從一邊轉至另一邊，眼球活動能成對比共軛朝向與頭部旋轉相反方向移動
- 78 有關罹患腦性麻痺的兒童及其家庭之護理指導，下列敘述何者錯誤？  
(A) 為預防下肢攣縮，可以雙手控制膝關節，將雙腿內轉合併  
(B) 教導三指下顎控制法，協助病童閉嘴咀嚼及吞嚥  
(C) 鼓勵病童獨立完成自我照顧工作，並適時給予肯定  
(D) 鼓勵病童就學與其他兒童互動，積極擴展社交聯繫
- 79 有關罹患成骨不全（osteogenesis imperfecta）兒童的醫療及護理指導，下列敘述何者錯誤？  
(A) 通常以骨內固定物做骨髓內固定，以加強長骨  
(B) 以脊椎固定桿合併骨水泥矯正部分脊椎變形  
(C) 因骨骼脆弱易發生骨折，應儘量完全固定不動  
(D) 在活動限制下執行主動運動，防止肌肉萎縮
- 80 祥祥，18 個月大，護理師執行格拉斯哥氏意識狀態（Glasgow coma scale, GCS）評估的結果如下：給予疼痛刺激，祥祥眼睛張開，且有退縮反應，但呼叫祥祥，並無反應，祥祥的格拉斯哥氏意識狀態分數是多少分？  
(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9