

護理師試題講解

# 兒科護理學

楊千慧 老師

# 108年護理師兒科 試題

1. 依據常見的嬰幼兒發展現象，一般嬰幼兒乳齒的生長順序，下列何者正確？

- ① 上排中央門牙
- ② 下排中央門牙
- ③ 犬齒
- ④ 第一臼齒
- ⑤ 第二臼齒

- (A) ①→②→③→④→⑤
- (B) ①→②→④→⑤→③
- (C) ②→①→③→④→⑤
- (D) ②→①→④→③→⑤

# 108年護理師兒科 試題

2. 小妮及小美為幼稚園的玩伴，坐在地板互借遊戲器材或玩具一起玩，她們此時的遊戲特徵為何？

(A) 競爭遊戲

(B) 合作遊戲

(C) 平行遊戲

(D) 聯合遊戲



# 108年護理師兒科 試題

3. 小明，1歲，罹患主動脈狹窄症（coarctation of the aorta）而入院，下列何者不是其症狀？

- (A) 上肢血壓比下肢高
- (B) 肺血管阻力升高而有發紺現象**
- (C) 常主訴頭痛、暈眩
- (D) 股動脈搏動較弱，甚至摸不到

# 108年護理師兒科 試題

4. 雯雯是法洛氏四重畸形 ( Tetralogy of Fallot's ) 的病嬰，當其出現發紺嚴重時，護理師為其採膝胸臥式姿勢，可使症狀改善的原理為何？
- (A) 減少全身血管的阻力，提高血壓
  - (B) 減少下肢回心血量，增加肺部血流
  - (C) 減少上肢回心血量，增加腦部的血液供應
  - (D) 減少血液循環全身的距離，提高全身循環血量

# 108年護理師兒科 試題

5. 葳葳，5歲，剛做完右心導管檢查，返回病房後護理師提供的護理措施，下列何者錯誤？
- (A) 臥床 6 小時，清醒後即可進食
  - (B) 評估檢查側之肢體循環，並與另一側比較
  - (C) 砂袋加壓穿刺部位，彎曲肢體防止砂袋掉落
  - (D) 觸診兩側肢體的脛骨後動脈或足背動脈，做對稱性比較

# 108年護理師兒科 試題

6. 有關胰島素注射的敘述，下列何者錯誤？

(A) 應先抽取短效胰島素RI後，再抽取中效胰島素NPH

(B) 以 Z 字法做肌肉注射

(C) 注射部位須輪換，以避免注射部位脂質增生，影響胰島素的吸收

(D) 胰島素注射部位吸收速度由快而慢之排列順序為：腹部 > 手臂 > 大腿 > 臀部

# 108年護理師兒科 試題

7. 兒童接受排空性膀胱尿道攝影(voiding cystourethrography)的主要目的是：

- (A) 了解尿路動力學
- (B) 了解泌尿道生理結構
- (C) 評估輸尿管逆流情形
- (D) 評估尿路結石情形



# 108年護理師兒科 試題

8. 有關嬰兒急救的程序，下列敘述何者正確？

(A) 可用刺腳跟的方式，檢查嬰兒是否失去意識

(B) 以手捏住嬰兒鼻子，口罩住其嘴巴吹兩口氣，進行人工呼吸

(C) 以 5 ~ 10 秒檢查嬰兒頸動脈的脈搏跳動

(D) 若懷疑嬰兒頸部損傷，應使用壓額抬下巴法

# 108年護理師兒科 試題

9. 陳小妹，1 歲半，14 公斤，從火場中被救出，全身 30% 的部分皮層燒傷，目前正滴注靜脈輸液，為評估輸液是否適當，陳小妹每小時的尿量應為多少 mL 較適宜？

(A) 6 mL

(B) 14 mL

(C) 30 mL

(D) 60 mL

## 108年護理師兒科 試題

10. 彤彤，因母親懷孕 30 週時突然破水致早產，出生體重 1020 公克，併有腦室內出血（intraventricular hemorrhage，IVH），下列護理措施，何者錯誤？
- (A) 抬高床頭 15 ~ 20 度，以減少顱內壓
  - (B) 密切監測出血徵狀，如血壓降低、血比容下降
  - (C) 觀察是否出現囟門膨出、頭圍增加等顱內壓升高現象
  - (D) 限制家屬探訪，避免造成感染

# 108年護理師兒科 試題

11. 有關新生兒壞死性腸炎之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 因週產期窒息腸道缺氧，引起壞死及細菌侵犯腸黏膜
- (B) 常侵犯部位為乙狀結腸及直腸壺腹處
- (C) 哺餵母乳為最佳的預防方法，母乳內之IgA能抑制或殺死細菌
- (D) 體溫測量時宜避免測量肛溫，以免傷害腸黏膜

# 108年護理師兒科 試題

12. 凱凱，足月產，體重 3050 公克，出生後 24 小時抽血呈現血清膽紅素值為 27 mg/dL，欲執行換血治療，下列相關描述，何者正確？

- (A) 採用之血液，最好為新鮮血液，或不超過 72 小時之血庫血袋，以防止血袋中鉀離子過高
- (B) 為預防血袋內抗凝血劑所含之檸檬酸，與嬰兒血中鈣結合引起高血鈣，需注射抑鈣激素 ( calcitonin )
- (C) 備血之血量為嬰兒全身血量的 3 倍，約 800mL為原則
- (D) 如因Rh血型不合而發生溶血者，應備O型且Rh血型為陽性

# 108年護理師兒科 試題

13. 依照衛生福利部疾病管制署 106 年公布之「我國現行兒童預防接種時程」，卡介苗（BCG）之建議接種時間為：

- (A) 出生滿 7~21 天
- (B) 出生滿 1~4 個月
- (C) 出生滿 5~8 個月
- (D) 出生滿 9~12 個月

# 108年護理師兒科 試題

14. 小冬，5 歲半，是一位初診斷後長期需要類固醇治療的腎病症候群的病童，今年秋天母親提出預防接種的問題，下列何種疫苗適用於小冬？

(A) 水痘疫苗 ( varicella )

(B) 麻疹疫苗 ( measles )

(C) 流行性感冒病毒 ( influenza )

(D) 麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 ( MMR )

# 108年護理師兒科 試題

15. 有關哮吼 ( croup ) 之敘述，下列何者正確？

(A) 最常引起的致病原是A群 $\beta$ 型葡萄球菌

(B) 較易發生在學齡期兒童

(C) 呼氣時會聽見哮喘聲 ( stridor )

(D) 病童會出現聲音沙啞 ( hoarseness )、喉嚨緊縮及狗吠式咳嗽 ( barking cough )



# 108年護理師兒科 試題

16. 有關扁桃腺切除術（ tonsillectomy ）後的護理措施，下列敘述何者錯誤？

- (A) 鼓勵病童常做咳嗽動作，以利肺部擴張
- (B) 協助採側臥或俯臥，以利分泌物引流
- (C) 觀察嘔吐物是否含血液性質
- (D) 開始進食後，可提供冰涼的果凍、布丁、冰淇淋

# 108年護理師兒科 試題

17. 下列那一項胸腔物理治療是利用重力原理，使肺內的分泌物，易流至較大的支氣管，以利痰液排除？

- (A) 震顫
- (B) 姿位引流**
- (C) 叩擊
- (D) 抽痰



# 108年護理師兒科 試題

18. 小紅，7歲，因發燒、咳嗽、流鼻水症狀而入院。診斷為黴漿菌感染性肺炎（*mycoplasma pneumonia*），下列敘述何者正確？

(A) 好發於1~3歲兒童

(B) 使用藥物為erythromycin或azithromycin

(C) 傳染途徑主要為接觸傳染，應加強洗手

(D) 主要由腺病毒引起，導致黏膜水腫

# 108年護理師兒科 試題

19. 近年來由於飲食及生活型態的改變，致使那一類型的問題疾病增加？

(A) 第一型糖尿病 ( type 1 diabetes )

(B) 第二型糖尿病 ( type 2 diabetes )

(C) 葡萄糖耐受性不良 ( impaired glucose tolerance )

(D) 糖尿病酮酸症 ( diabetes ketone acidosis )

## 108年護理師兒科 試題

20. 有關於先天性腎上腺素增生症 ( congenital adrenal hyperplasia , CAH ) , 下列敘述何者正確 ?
- (A) 是一種體染色體顯性遺傳疾病
  - (B) 24 小時尿液 17-ketosteroids ( 17-KS ) 會下降
  - (C) 夜間服用cortisone , 以維持正常皮質類固醇分泌
  - (D) 注意每日體重、輸入、輸出量及鈉、鉀離子之平衡

# 108年護理師兒科 試題

21. 小鋼，7歲，罹患威廉氏腫瘤（Wilms tumor）第三期，即將接受腎臟切除術。下列敘述何者正確？

(A) 屬無觸痛感之良性腫瘤

(B) 術前可按摩病童腹部，減輕腫脹不適

(C) 第三期腫瘤局限於腎臟及周邊組織，以腎臟切除手術即可完全根除

(D) 需監測腎功能、血壓及輸出入量

## 108年護理師兒科 試題

22. 王小弟，3歲，罹患腎病症候群（nephrotic syndrome），目前服用prednisolone治療。護理師在安排與王小弟同住的病童時，下列何者適宜？

- (A) 2歲，張小弟，診斷哮吼（croup）
- (B) 3歲，吳小弟，診斷腸病毒（enterovirus）
- (C) 3歲，李小妹，診斷水痘（varicella）
- (D) 4歲，陳小妹，診斷疝氣（hernia）

# 108年護理師兒科 試題

23. 王小弟，8歲，罹患細菌性腦膜炎（bacterial meningitis），下列徵象何者正確？

- (A) 巴氏徵象（Barlow's sign）陰性
- (B) 布魯金斯基氏徵象（Brudzinski's sign）陽性**
- (C) 克爾尼格氏徵象（Kernig's sign）陰性
- (D) 反彈性疼痛（Rebounding pain）陽性



# 108年護理師兒科 試題

24. 有關腰椎穿刺之敘述，下列何者錯誤？

(A) 可做為檢查、診斷或治療途徑

(B) 採俯臥平躺，以利穿刺針頭插入，避免傷害

(C) 穿刺後宜觀察中樞神經系統感染、脊髓脫出等合併症

(D) 穿刺後應教導平躺 4~6 小時，避免頭痛等合併症

# 108年護理師兒科 試題

25. 林小弟，妊娠週數 37 週又 3 天，出生體重 2950 公克，採純母乳哺餵，今體重 2620 公克，減少出生體重的 10% 以上，給予檢測血糖為 33 mg/dL，有關低血糖可能造成的影響及處理，下列何者錯誤？

- (A) 立即給予口服餵食葡萄糖水、母乳或配方奶
- (B) 若餵食不順，則應給予靜脈注射葡萄糖液
- (C) 建議每 6 ~ 8 小時監測一次血糖
- (D) 治療目標應維持血糖在 45 mg/dL 以上

# 108年護理師兒科 試題

26. 有關腸病毒傳染途徑的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 發病前數天在喉嚨及糞便都有病毒存在，但不具傳染力
- (B) 腸病毒感染者之傳染力，在發病後 1 週是高峰
- (C) 一般腸病毒在呼吸道口沫中，可存留約 1~3 週
- (D) 可持續經由腸道釋出病毒，時間可達 2~3 個月

# 108年護理師兒科 試題

27. 有關川崎氏症 ( Kawasaki Disease ) 的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 急性期會持續發燒 5 天以上，並有草莓狀舌
- (B) 急性期給予高劑量阿司匹靈 ( Aspirin ) 可抗發炎及抑制血小板凝集
- (C) 亞急性期病童的手指、腳趾、肛門會有脫皮現象
- (D) 當症狀獲得控制後，仍須長期追蹤其中樞神經系統病變