



護理師

內外科護理學

樂學網

李一芹老師

1. 有關病人心智狀態評估內容的敘述，下列何者錯誤？

- (A)可以利用簡易心智狀況量表(Mini Mental State Examination, MMSE)進行測試
- (B)可以依判斷力、定向感、記憶力、注意力、抽象思考能力、計算力進行評估
- (C)詢問病人有關「人、時、地」的確認能力，主要是評估注意力
- (D)詢問老年病人年輕時的基本資料如求學、求職等，主要是評估遠期記憶力

2. 有關病人已出現顱內壓升高的護理處置，下列敘述何者錯誤？

- (A)保持病人的頭頸在正中位置
- (B)抬高床頭 30 度
- (C)將抽痰、翻身拍背、擦澡等活動都集中一次完成
- (D)應注意體溫的控制及維持排便正常

3. 有關腰椎椎間盤突出的敘述，下列何者錯誤？

- (A)俗稱為「下背疼痛」，此種疼痛會向下延伸至臀部、大腿後側及小腿
- (B)進行直舉腿試驗(straight leg raising test)可伸展到 90 度
- (C)進行 Kernig sign 試驗，病人將小腿往上伸展會覺得有阻力且感到劇烈疼痛
- (D)病人咳嗽、提重物、彎腰、長時間站立或坐著都會使疼痛加劇

4. 「走失」是阿茲海默氏症(Alzheimer's Disease)病人，那一期重要臨床表徵？

- (A)極早期
- (B)早期
- (C)中期
- (D)末期

5. 有關巴金森氏症病人日常生活護理指導，下列何者錯誤？

- (A)行走時可使用助行器來維持平衡
- (B)衣服儘量選擇以魔鬼氈代替釦子
- (C)儘量多休息以減少活動產生震顫
- (D)馬桶可提高坐墊方便坐下或起身

6.有關頭部創傷之敘述，下列何者正確？

- (A)腦震盪是因外力造成暫時性的神經功能缺失，且腦組織有實質性的損傷
- (B)腦挫傷是因沒有腦組織的實質性損傷，所以受傷後常會出現腦震盪症候群
- (C)若出現鼻漏且確認是腦脊髓液，表示病人的硬腦膜受損
- (D)有鼻漏或耳漏的病人通常要儘快用抽吸管抽吸乾淨

7.有關腦波檢查的護理措施，下列何者錯誤？

- (A)說明檢查可診斷腦腫瘤
- (B)告知病人檢查前，需清洗頭髮
- (C)確認腦波室內備有足夠的點滴及氧氣
- (D)檢查後，留在頭皮及頭髮上的黏膠，可用丙酮清理

8.有關脊髓損傷導致「自主神經射過度」的敘述，下列何者正確？

- (A)常發生於 T6~T12 受傷的病人
- (B)走路運動是可能的誘因
- (C)出現嚴重的高血壓及搏動性頭痛
- (D)心跳加速

9.有關腸阻塞的臨床表徵，下列何者正確？1.嘔吐 2.腹脹 3.腹部絞痛 4.腹瀉

- (A) 1.2.3.
- (B) 1.2.4.
- (C) 1.3.4.
- (D) 2.3.4.

10.有關肝硬化引起腹水機轉之敘述，下列何者正確？

- (A)微血管靜力壓下降
- (B)血清白蛋白下降
- (C)血漿膠體滲透壓上升
- (D)有效循環血量上升

11.有關預防傾倒症候群(Dumping Syndrome)的護理指導，下列何者正確？

- (A)鼓勵病人少量多餐，進食時採半坐臥
- (B)鼓勵病人多進食富含水分的食物
- (C)治療先從增加碳水化合物飲食開始
- (D)建議採高脂肪、低蛋白、高糖食物

12.下列何者不是食道癌常見的臨床表徵？

- (A)吞嚥困難
- (B)食慾不振
- (C)腹痛
- (D)聲音沙啞

13.有關隔裂孔疝氣的敘述，下列何者正確？

- (A)造成原因是胃自橫膈的食道裂孔往上進入縱膈腔內
- (B)食道旁疝氣常出現反流症狀
- (C)滑動疝氣發生率占所有隔裂孔疝氣的 20%
- (D)隔裂孔疝氣的原因為橫膈肌痙攣或腹內壓降低所致

14.有關口腔炎的分類及臨床表徵，下列何者正確？

- (A)單純性疱疹常因細菌感染導致
- (B)缺乏維生素 C 會引發口角炎
- (C)念珠菌感染好發於口腔衛生習慣不好者
- (D)常有疼痛、吞嚥困難及口腔出血等症狀

15.有關癌症病人貧血問題之敘述，下列何者錯誤？

- (A)全胃或脾臟切除手術會影響病人紅血球的生成
- (B)貧血症狀包括蒼白、心跳變慢、血壓上升、易疲倦等
- (C)鼓勵病人補充鐵質和含葉酸食物，如牛肉、綠色蔬菜
- (D)集中護理可讓病人獲得充分的休息

16. 有關膽結石好發之高危險群，下列何者最不可能？

- (A)女性
- (B)肥胖者
- (C)口服避孕藥者
- (D)曾接受胃部手術者

17. 有關心口灼熱(Heart Burn)的敘述，下列何者錯誤？

- (A)是下食道括約肌異常所致
- (B)病人常以痙攣痛或打結般形容此不適
- (C)進食後平躺可緩解症狀
- (D)是食道疾病的常見症狀

18. 有關腕隧道症候群的敘述，下列何者正確？

- (A)是指腕部正中神經受到壓迫所造成的現象
- (B)主要發生在男性，以 50~60 歲居多
- (C)臨床症狀是疼痛且腕部無法伸直
- (D)可藉由膨脹徵象(Bulge sign)與霍曼氏徵象(Homan's sign)確定診斷

19. 王先生開放性骨折日前出院返家，近日發燒、寒顫、躁動不安、患肢持續性疼痛及拒絕移動關節或觸碰患肢。下列何者為其最可能的合併症？

- (A)肺栓塞
- (B)骨髓炎
- (C)脂肪栓塞
- (D)低血容積休克

20. 有關痛風藥物 Probenecid (Benemid)的主要作用，下列何者正確？

- (A)抑制尿酸形成
- (B)增加尿酸排出
- (C)降低普林排出
- (D)抑制炎症反應

21. 有關骨折的癒合過程，下列順序何者正確？1.血腫形成期 2.骨化期 3.細胞增生期 4.重塑期 5.骨痂形成期

- (A) 1.2.3.4.5.
- (B) 1.3.5.2.4.
- (C) 2.3.1.4.5.
- (D) 5.4.3.2.1.

22. 有關青光眼病人之護理措施，下列何者正確？

- (A)眼內壓上升超過正常值且造成視神經受損，稱為青光眼
- (B)準備病人接受晶狀體植入
- (C)熬夜不會影響眼壓
- (D)指導病人術後臥向手術側

23. 有關中耳炎手術病人之術後護理指導，下列何者錯誤？

- (A)手術後要觀察有無切斷顏面神經的合併症
- (B)病人應採用軟質飲食
- (C)禁做會阻塞耳咽管的伐氏操作法(Valsalva's Maneuver)
- (D)勿用力擤鼻子、用力咳嗽或打噴嚏

24. 下列腫瘤何者源自結締組織？

- (A)滑液膜肉瘤(synovial-sarcoma)
- (B)軟骨肉瘤(chondrosarcoma)
- (C)血管肉瘤(angiosarcoma)
- (D)淋巴管肉瘤(lymphangiosarcoma)

25. 有關聽力喪失病人的護理指導，下列何者錯誤？

- (A)與別人溝通時，等待對方先開口
- (B)採用適當的位置，使說話者面部採光良好
- (C)要求對方先說明主題，當改變話題時先通知
- (D)家中電話加裝擴音器，或家中電鈴加裝閃光

26. 有關心臟復健(Cardiac Rehabilitation, CR)活動時注意事項的敘述，下列何者錯誤？

此題 2/8 李一芹直播有提及

- (A)活動時應以漸進性方式增加強度
- (B)活動初期的心跳速率以其最大心跳的 80%為原則
- (C)活動時的心跳速率以不超過靜態休息時的 20 次分鐘為原則
- (D)活動後血壓上升以不超過正常血壓值 25mmHg 為原則

李一芹老師解析

- B.初期活動心跳速率以最大心跳的 **20% (20 次/每分)** 為主
D.活動後血壓上升不超過正常血壓 **20mmHg** 為原則

27. 王先生經醫生診斷為柏格氏病(Buerger's Disease)，下列敘述何者正確？

- (A)與抽菸有關
- (C)好發在上肢
- (B)主要是周邊靜脈之阻塞
- (D)走路無異狀

李一芹老師解析

柏格氏病(Buerger's Disease)是指周邊動脈阻塞性疾病與抽菸有關

28. 有關心絞痛病人接受股動脈經皮穿腔冠狀動脈血管成形術(PTCA)術後護理，下列何者錯誤？

- (A)監測雙側肢體之脈搏
- (B)監心電圖
- (C)鼓勵病人多飲水
- (D)鼓勵病人行下肢全關節主動運動

29. 有關裝置心臟節律器之護理指導，下列何者錯誤？

- (A) 心律變慢時，可能是電池快沒電的徵象
- (B) 每天需監測動脈至少 1 分鐘整
- (C) 持續打嗝時，可利用 Valsalva 運動減緩打嗝
- (D) 術後 6 週內避免抬重物

30. 有關心因性休克之敘述，不列何者錯誤？

- (A) 心臟幫浦功能障礙造成循環衰竭
- (B) 最常見之致病原因為心肌梗塞
- (C) 最常見之症狀為呼吸停止
- (D) 心輸出量不符身體組織所需

31. 有關聽診心音之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 第一心音的產生是僧帽瓣與三尖瓣關閉血液撞擊所造成
- (B) 聽診心音的主動脈瓣區在胸骨右緣第 2 肋間
- (C) 聽到第二心音之後心動週期進入心室的舒張期
- (D) 心臟衰竭病人如出現第三心音會在心室的舒張末期聽到

32. 下列血流動力學檢查結果何者正常？

- (A) 右心房壓力 130 mmHg
- (B) 右心室收縮壓 120 mmHg
- (C) 左心室舒張壓 40 mmHg
- (D) 上腔靜脈壓 8 mmHg

33. 輸注下列何種藥物時，需以不透光錫箔紙包住點滴瓶及輸液管？

- (A) Diazoxide (Hyperstat)
- (B) Dobutamine (Dobutrex)
- (C) Nitroglycerin (Tridil)
- (D) Nitroprusside (Nipride)

34. 下列何者是心肌梗塞最常見且會導致死亡的併發症？此題 2/8 李一芹直播有提及

- (A) 心因性休克
- (B) 心肌梗塞再度發生
- (C) 心律不整
- (D) 急性肺水腫

35. 有關缺鐵性貧血病人的護理措施，下列何者正確？1.教導病人使用吸管吸食液態鐵劑 2.鼓勵病人飯後服用鐵劑以增加鐵的吸收 3.鼓勵病人多攝取富含維生素 C 的食物 4.注射鐵劑後應避免立即拔出針頭

- (A) 1.2.3.
- (B) 1.2.4.
- (C) 1.3.4**
- (D) 2.3.4.

36. 林先生接受骨髓移植後 2 週出現黃疸、腹水、體重增加，下列何者為最可能發生之合併症？

- (A) 感染
- (B) 間質性肺炎
- (C) 肝靜脈阻塞疾病**
- (D) 慢性移植植物對抗宿主疾病

37. 有關白血病病人接受異體骨髓移植後出現合併症之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 移植前曾罹患肝炎者會增加肝靜脈阻塞的機率
- (B) 急性移植植物對抗宿主疾病以皮膚、腸胃道及肝臟為主
- (C) 慢性移植植物對抗宿主疾病的發生率與年齡有關
- (D) 移植後 2 星期內的感染以巨細胞病毒感染最常見**

38. 有關特異性血小板減少性紫斑症之敘述，下列何者正確？1.可能與自體免疫疾病有關 2.骨髓檢查可發現巨核細胞增加 3.須避免使用 Aspirin 的藥物 4.經常發生於細菌感染後

- (A) 1.2.3.**
- (B) 1.2.4.
- (C) 1.3.4.
- (D) 2.3.4.

39. 有關化學治療藥物作用機轉與副作用之敘述，下列何者錯誤？

- (A) Cisplatin 屬煙基化合物，常見副作用是噁心嘔吐、耳毒性和周邊神經病等
- (B) Fluorouracil(5-FU)屬抗代謝藥物，常見副作用是口腔炎、骨髓抑制等
- (C) Doxorubicin 屬類固醇藥物，可促進 G₀ 期癌細胞進入分裂期**
- (D) Vincristine 屬植物鹼類藥物，作用於 M 期，干擾有絲分裂

40. 有關放射線治療病人照射處皮膚照護之敘述，下列何者錯誤？

- (A)要用中性肥皂搓洗避免感染
- (B)不可塗抹含酒精的乳液
- (C)可依醫囑塗抹氧化鋅
- (D)只能使用電動刮刀

41. 有關癌症病人出血問題之敘述，下列何者錯誤？

- (A)血小板數目 8 萬/ μL 是正常的數據
- (B)消化道出血時，可使用冰鹽水灌洗
- (C)有出血傾向的病人要限制使用 Coumadin 和 Heparine
- (D)要避免肌肉注射或量肛溫等侵入性處置

42. 有關乳癌症狀與疾病分期之敘述，下列何者正確？

- (A)好發部位在乳房的內上 1/4 處
- (B) T2N1M0 屬於癌症分期的第三期
- (C)最常見的症狀為疼痛性腫塊
- (D)乳頭下腫塊會造成乳頭回縮或高低不一

43. 有關前列腺癌之敘述，下列何者正確？

- (A)藥物治療大多使用雄性素
- (B)放射線治療時最常使用鈷 60 放射源
- (C)鹼性磷酸酶值過高與前列腺癌之診斷有關
- (D)前列腺特異性抗原(PSA)濃度可做為治療效果的參考

44. 有關決定膚色的黑色素細胞主要分布在下列那一層？

- (A)顆粒層
- (B)棘狀層
- (C)基底層
- (D)網狀層

45. 有關全身性紅斑狼瘡之護理措施，下列何者錯誤？

- (A)出門時應穿長袖衣物及穿戴寬邊帽子防曬
- (B)出現血尿、蛋白尿等狀況時，應多下床活動
- (C)慢性疲勞時，建議執行漸進式活動，如步行或游泳等
- (D)若有生育考量，於病情控制良好 6 個月後，再與醫師討論懷孕計畫

46. 有關感染疥瘡(Scabies)引起皮膚疾病之敘述，下列何者錯誤？

- (A)人體接觸疥蟲後 2 週左右會出現症狀
- (B)疥蟲感染者所使用的床單，在 2 週內具有傳染力
- (C)劇癢症狀好發在頸部以下
- (D)衣物用具加熱煮沸可以殺死疥蟲

47. 有關燒傷深度的敘述，下列何者錯誤？

- (A)一度燒傷是指表皮受到損害，會有疼痛感
- (B)二度燒傷是指真皮層受到損傷，會有劇烈疼痛
- (C)三度燒傷是指全皮層的損傷，會有劇烈疼痛
- (D)四度燒傷是指全皮層、肌肉和骨骼的損傷，沒有疼痛感

48. 有關後天免疫缺乏症候群(Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS)之敘述，下列何者錯誤？

- (A)不會經由握手、擁抱共餐、共用馬桶、游泳、蚊蟲叮咬等途徑傳染病毒
- (B)有皮膚疾患或懷孕的醫療人員不應直接對病人進行醫療照護
- (C)由於病人容易產生伺機性感染，避免到人多擁擠的公
- (D)病人應定期接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)與流感疫苗

49. 有關器官移植後之護理指導，下列何者錯誤？

- (A)移植後應多做戶外運動、曬太陽，以增強抵抗力
- (B)移植後避免出入公共場所，外出戴口罩
- (C)移植後服藥出現藥物副作用，不可自行停藥，回診由醫師調整用藥
- (D)移植後需要暫時避孕，若準備懷孕應事先與醫師討論

50. 類風濕性關節炎之敘述，下列何者正？
1.手部關節會出現尺側偏斜 2.活動後有僵硬現象 3.關節X光變化呈現關節腔變窄 4.關節腫脹呈現不對稱性

- (A) 1.2.
- (B) 1.3.
- (C) 2.4.
- (D) 3.4.

51. 有關鞏皮症之述，下列何者正確？

- (A)又稱「進行性系統性硬化症」，好發於男性
- (B)常發生雷諾氏症候群(raynaud's syndrome)
- (C)血液檢查γ-球蛋白增加，主要 IgA 增加

(D)侵犯臉部，造成臉部表情豐富現象

52. 有關使用呼氣末期陽壓 (PEEP) 治療急性呼吸窘迫症候群的主要目的，下列何正確？

(A)可避免肺纖維化的產生

(B)可使吸氣時有更多氣體帶入肺內

(C)可將 100%的氧氣帶入肺內

(D)可避免吐氣時肺泡塌陷

53. 下列何者為肺水腫最典型的症狀？

(A)呼吸音出現肋膜摩擦音

(B)突然胸痛

(C)粉紅色泡沫痰

(D)杵狀指

54. 病人行氣管內插管後聽診呼吸音時，發現左側肺部呼吸音減弱但右側正常，下列何者為導致此情形最可能的原因？

(A)氣管內管插到食道中

(B)氣管內管插到右主支氣管內

(C)氣管內管插到氣管分叉處上

(D)病人有左肺肺炎

55. 有關呼吸器的使用，通常會設定每分鐘數次深呼吸，其所要預防之首要合併症，下列何者正確？

(A)氣胸

(B)肺栓塞

(C)肺炎

(D)肺擴張不全

56. 照護右上肺葉肺炎病人之護理措施，下列何者不適當？

(A)協助病人右側臥

(B)教導病人抱胸咳嗽

(C)將病人床頭抬高 45 度

(D)鼓勵病人下床活動

57. 有關肺栓塞的醫療處置，下列何者錯誤？

(A)給與氧氣治療，維持 PaO₂ 在 60mmHg 以上

(B)抬高下肢增加靜脈回流

(C)給與 Streptokinase 預防血栓形成

(D)在下腔靜脈放入腔靜脈過濾器

58. 肺炎發生時，於肺實質所產生的病生理變化，不包括下列何者？

- (A)肺塌陷
- (B)支氣管擴張症
- (C)肺積水
- (D)發炎反應

59. 胸腔手術後病人進行深呼吸運動之主要成效，下列何者正確？

- (A)可以提高橫膈膜，使胸腔擴大且增加肺部進行氣體交換的表面積
- (B)可增加到肺部的血流量，使術後復原較快
- (C)可控制氣體的流速，使病人不會過度通氣
- (D)可擴張肺泡，增加氣體交換的表面積

60. 有關電解質失調之症狀評估結果，下列何者錯誤？

- (A)高血鈉症會致肌肉軟弱無力
- (B)低血鈣症常有凝血時間延長
- (C)低血鉀症常有便秘腹脹現象
- (D)低血鈣症易導致手足抽搐

61. 林小姐食慾不振，嚴重水腫，無法平躺睡覺，至某醫學中心就診，抽血檢查結果血清 Creatinine=13.8 mg/dL，eGFR=9.2 mL/min/1.73m²，依此結果，林小姐是處於慢性腎病 (CKD) 的第幾期？

- (A)第二期
- (B)第三期
- (C)第四期
- (D)第五期

62. 承上題，下列何項為林小姐接下來的重要處理目標？

- (A)減緩腎功能惡化
- (B)尿毒症相關之護理指導
- (C)建立血管通路
- (D)開始透析治療或腎移植

63. 張先生 50 歲，患有糖尿病腎病變，下列治療何項錯誤？

- (A)鼓勵病人每天多攝取蛋白質 (1.5~2.0g/天)
- (B)將糖化血色素控制在 7% 以內

- (C)將血壓控制在 130/80 mmHg 以內
- (D)血管收縮素轉化酶抑制劑 (ACEI) 可用來控制血壓

64. 梁太太規律接受血液透析，因腎性貧血服用葉酸，其最恰當的服用時間為何？

- (A)透析前半小時服用
- (B)開始透析時立即服用
- (C)透析當中服用
- (D)透析結束後服用

65. 有關酸鹼不平衡之敘述，下列何者錯誤？**C 或 D 均給分**

- (A)慢性阻塞性肺疾病病人易致呼吸性酸中毒
- (B)歇斯底里症者、過度焦慮者，易致呼吸性鹼中毒
- (C)嚴重腹瀉者，易致代謝性鹼中毒
- (D)嚴重嘔吐者，易致代謝性酸中毒

66. 有關腎臟活體組織切片檢查之敘述，下列何者錯誤？

- (A)透過超音波導引取出組織切片，以確認腎實質疾病之病因
- (B)通常穿刺時採俯臥姿，部位大約於第 12 肋骨與脊椎交角中間
- (C)檢查前需確認凝血功能，以及暫停使用含 Aspirin 成分之藥物
- (D)檢查後 24 小時內應臥床休息，避免下床活動

67. 有關慢性腎衰竭的典型臨床表徵，下列何者錯誤？

- (A)氮血症
- (B)高血脂
- (C)低血磷
- (D)代謝性酸中毒

68. 有關經尿道前列腺切除術的敘述，下列何者**錯誤**？

- (A)透過電刀切除前列腺，是良性前列腺肥大第一線最常用的治療方式
- (B)若手術過程吸收過多沖洗液，容易引起腦水腫需注意病人意識狀態
- (C)出血是最常見的合併症，術後需要持續用生理食鹽水做膀胱灌洗
- (D)若尿道內括約肌有受損，可能導致性行為高潮時出現逆行性射精

李一芹老師解析

手術後用生理鹽水持續做灌洗室為了預防血塊產生

69. 有關黏液水腫昏迷之檢查結果，下列何者錯誤？

- (A)血清中 T4 下降

(B)血中 TSH 下降

(C)血鈉下降

(D)血糖下降

70. 有關抗利尿激素分泌不當症候群 (SIADH) 之臨床表徵，下列何者錯誤？

(A)通常是由泌尿道疾病引發

(B)最常出現症狀是食慾不振

(C)血鈉濃度會 <135mEq/L

(D)病人會出現低尿酸血症

71. 有關糖尿病病人足部護理，下列何者正確？
1.直線修剪趾甲緣 2.每日以溫水浸泡清洗足部 30 分鐘 3.穿著色深、柔軟的尼龍襪，且每日換 4.足部傷口沖洗後，消毒敷料覆蓋，紙膠固定，應儘速就醫

(A) 1.2.

(B) 1.4.

(C) 2.3.

(D) 3.1.

72. 有關糖化血紅素 (HbA1c) 的敘述，下列何者正確？

(A)當 <10% 表示控制良好

(B)反應過去 6 個月內血糖控制的情形

(C)不受禁食、驗血時間所影響

(D)正常人約 4~9%

73. 有關甲狀腺功能低下症之護理措施，下列何者正確？

(A)服用甲狀腺素時採飯後使用，以避免胃酸增加

(B)使用甲狀腺素藥物時須監測血糖之變化

(C)給予病人電毯或熱水袋，以增加舒適及保暖

(D)鼓勵採高熱量、低纖維、低脂肪飲食

74. 有關糖尿病酮酸中毒 (DKA) 與高滲透壓高血糖狀態 (HHS) 之臨床處置，下列何者正確？

(A) HHS 需補充的水分較少

(B) HHS 需要較多的胰島素治療

(C) HHS 較 DKA 更需補充重碳酸鈉

(D) HHS 不需要補充鉀離子

李一芹老師解析

高血糖高滲透本身胰島素濃度不足使血糖上升，HHS 血糖值會比 DKA 來得高，胰島素的使用需求量也多，DKA 跟 HHS 都需要補充鉀離子

75. 有關使用 Spironolactone (Aldactone) 藥物指導之敘述，下列何者正確？
1.須注意鉀離子濃度
2.須注意鎂離子濃度
3.鼓勵多食用柑橘類食物
4.不宜食用芭樂

- (A) 1.3.
- (B) 1.4.
- (C) 2.3.
- (D) 2.4.

76. 下列何者不是休克時會發生之代償機轉？

- (A)刺激交感神經分泌腎上腺素，造成血管收縮
- (B)刺激交感神經，使呼吸加速及加深
- (C)刺激內分泌系統分泌血管緊縮素，促進血管收縮
- (D)刺激消化道系統，促進腸胃蠕動

77. 下列何種情況最可能引發神經性休克？

- (A)蜜蜂螯傷引發休克
- (B)張力性氣胸造成休克
- (C)心肌梗塞造成休克
- (D)車禍脊髓受損造成休克

78. 有關敗血症之敘述，下列何者錯誤？

- (A)血小板>140,000 cells/ μ L
- (B)尿量<0.5mL/kg/hr
- (C)膽紅素>4 mg/dL
- (D)收縮壓<90 mmHg

79. 病人輸血 10 分鐘時出現荨麻疹及哮喘之處置，下列何者錯誤？

- (A)需密切監測生命徵象的變化
- (B)暫停輸血 5 分鐘，再繼續進行輸血
- (C)維持呼吸道暢通
- (D)給予 Epinephrine 及 Aminophylline

80. 有關腸病毒之敘述，下列何者錯誤？

- (A)經由腸胃道、呼吸道或接觸病人皮膚水的液體而感染
- (B)感染時會出現發燒、手足口症及疱疹性咽峽炎等症狀

(C)發病前 1 週內傳染力最強，成人感染發病時多無症狀，且無傳染力

(D)引起腸病毒感染併發重症之型別以腸病毒 71 型為主



立即開啟直播通知

<https://www.youtube.com/watch?v=xIg3m1OvFY8>

347.com.tw