

112年第一次專門職業及技術人員高等考試 營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：內外科護理學
考試時間：1小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 罹患腦下垂體腫瘤病人，醫師建議使用伽馬刀療法，下列何者顯示病人已了解本項治療？
(A)治療時我的頭部會有一個切開傷口 (B)治療時我不會疼痛也不會流血
(C)治療後我的頭部會有留一條小型引流管 (D)治療後我的腦瘤會立即消失
- 與阿茲海默症病人的溝通技巧，下列何者不適宜？
(A)若病人只能說出單字或短句，照顧者也要用簡單、易了解的字彙或圖片與其溝通
(B)當病人出現眼神避開時，表示不了解溝通內容
(C)溝通時，應該使用低音量、高音調及緩慢的速度
(D)可以善用拍打和擁抱的觸覺刺激，協助病人表達
- 有關多發性硬化症病人的自我照顧之護理指導，下列敘述何者錯誤？
(A)鼓勵病人多攝取水分和高纖食物，預防便秘 (B)依排定如廁時間表，提醒病人如廁
(C)減少社交參與，避免造成身體心像紊亂 (D)若出現複視，可以使用眼罩遮住一眼，緩解複視
- 有關腦腫瘤病人術後發生尿崩症，下列敘述何者正確？
(A)尿比重會比正常人高 (B)會有尿量多、血漿滲透壓下降
(C)因抗利尿素（ADH）分泌不足所致 (D)可能有低血鈉導致抽搐症狀
- 有關顱內壓升高的藥物治療，下列敘述何者錯誤？
(A)類固醇治療可用於腦瘤引起的血管性腦水腫
(B) Mannitol 滲透性利尿劑若出現反彈現象會使腦水腫更嚴重
(C)巴比妥酸鹽可降低腦組織代謝及使得血流均勻供應腦部
(D)顱內壓升高病人皆須給與抗痙攣藥物以預防抽搐發作
- 有關巴金森氏症病人的日常活動指導，下列敘述何者錯誤？
(A)行走時使用底面積較寬的助行器維持平衡
(B)漸進式運動計畫以增加病人肌肉力量，鼓勵全關節運動
(C)鼓勵病人以寬步伐行走，行走時身體直立，提醒腳跟先著地
(D)因身體僵硬，鼓勵坐深且柔軟的椅子
- 進行意識評估，病人無法自動睜眼，叫喚才會睜開眼睛，人、地定向感清楚，但時間回答錯誤，能遵照指示做出正確的動作，其 GCS 昏迷量表，下列何者正確？
(A) E4V5M6 (B) E4V4M5 (C) E3V4M6 (D) E3V3M5
- 有關中風病人臥床姿勢擺位之護理措施，下列何者錯誤？
(A)避免採高坐臥姿，防髖關節屈曲畸形 (B)大腿外側使用粗隆捲軸，防止髖關節外旋
(C)膝關節下墊枕頭，防止膝關節屈曲畸形 (D)患側腋下墊枕頭，防止肩關節內收

- 9 B 型肝炎病毒帶原者且 HBeAg (+)，下列敘述何者正確？
(A)目前是急性 B 型肝炎病毒的恢復期 (B)對於 B 型肝炎病毒已經有免疫力
(C)目前具有 B 型肝炎病毒高傳染力 (D)可能會併發 C 型肝炎病毒感染
- 10 進行內視鏡逆行性膽胰攝影檢查，若導管不易進入總膽管，可使用下列何種藥物讓歐迪氏括約肌 (sphincter of Oddi) 鬆弛？
(A) Atropine (B) Buscopan (C) MgSO₄ (D) Xylocaine
- 11 有關升結腸造瘻的敘述，下列何者正確？
(A)水分需求增加 (B)糞便呈半成形狀
(C)須定期做結腸灌洗 (D)經訓練後排便可具規律性
- 12 有關肝活體組織切片檢查，下列敘述何者正確？
(A)檢查中，教導個案深呼吸，於吸氣後閉氣 5~10 秒進行穿刺
(B)檢查後，立即協助個案正躺，傷口以彈繃加壓
(C)檢查後，若病人主訴右肩疼痛，應懷疑橫膈下積血
(D)檢查後，除短暫下床如廁外，需臥床 4~6 小時
- 13 有關迴腸造瘻口的護理指導，下列何者正確？
(A)多吃蛋、乳酪等食物 (B)多攝食高纖維的食物
(C)記錄迴腸造瘻的引流量 (D)每天攝取不超過 1,500 c.c.的液體
- 14 有關慢性胃炎之敘述，下列何者錯誤？
(A) A 型慢性胃炎主要與幽門桿菌的感染有關 (B) B 型慢性胃炎常發生在胃竇處
(C) B 型慢性胃炎的胃泌素值正常 (D) A 型慢性胃炎可能形成惡性貧血
- 15 有關口腔癌的敘述，下列何者錯誤？
(A)致病危險因子包括壓力、不良的口腔衛生及抽菸喝酒吃檳榔
(B)黏膜出血可視為是口腔癌的前驅症狀
(C)紅斑瘤有 90% 會變成鱗狀細胞癌
(D)多見於舌頭及頰黏膜等部位
- 16 有關食道憩室之敘述，下列何者錯誤？
(A)臨床上常以電腦斷層掃描來確定憩室的位置
(B)症狀嚴重時，可將憩室切除後再將食道黏膜吻合
(C)不可使用食道鏡或內視鏡檢查，以避免食道穿孔
(D)病人餐後 2 小時勿執行劇烈運動，以避免食物逆流
- 17 有關骨折病人發生脂肪栓塞之敘述，下列何者錯誤？
(A)好發於長骨骨折的病人 (B)多發生在骨折後 72 小時
(C)獨特表徵是皮膚出現瘀斑 (D)呼吸衰竭是常見的死因
- 18 有關不同關節炎病人的照護措施，下列何者錯誤？
(A)類風濕性關節炎，急性期採等張運動 (B)痛風性關節炎，需教導不可飲酒
(C)退化性關節炎，每天需俯臥 2 次 (D)退化性關節炎，應維持理想體重
- 19 有關腕隧道症候群病人之身體檢查評估結果，下列何者正確？
(A)湯瑪斯試驗 (Thomas test) 陽性反應 (B)浮動試驗 (ballottement test) 陽性反應
(C)麥默雷氏試驗 (McMurray's test) 陽性反應 (D)費林氏徵象 (Phalen's sign) 陽性反應

- 20 有關骨質疏鬆症病人對於護理指導之回覆，下列何者表示病人已經清楚指導內容？
(A)「我要多吃高蛋白食物來增加鈣質的吸收。」
(B)「我可以每天打網球或保齡球來防止骨質流失。」
(C)「我要多吃小魚乾、豆類食物以攝入足夠的鈣質。」
(D)「我要同時吃高纖與高鈣食物來增加鈣質吸收。」
- 21 白內障可能出現的症狀，下列何者正確？①眼睛痛 ②眼睛紅 ③視力模糊 ④瞳孔變灰或白色
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 22 一位高度數近視的病人，主訴眼前突然出現一群浮動的黑點，而且有部分視野缺失，下列建議何者不適宜？
(A)立刻臥床 (B)避免用力 (C)雙眼覆蓋眼罩 (D)立即冰敷
- 23 有關鼻部手術後的護理指導，下列何者最不適宜？
(A)抬高床頭採半坐臥姿勢 (B)勿用太熱的水洗臉、洗澡
(C)教導由口呼吸及注意口腔衛生 (D)出院後若鼻出血，自行加壓止血即可
- 24 有關喉癌病人接受全喉切除術的敘述，下列何者正確？
(A)氣管造口為暫時性的 (B)術後嗅覺喪失，但不影響味覺
(C)適合第一、二期喉癌病人 (D)術後仍可恢復正常的發聲功能
- 25 有關心包填塞 (cardiac tamponade) 的徵象，下列何者錯誤？
(A)奇異脈，吸氣時脈搏變弱 (B)心音模糊低沉
(C)脈搏壓變寬 (D)頸靜脈怒張
- 26 有關急性心肌梗塞的診斷檢查，下列敘述何者錯誤？
(A)血液中肌酸磷酸激酶 (CPK) 升高可以表示組織損傷
(B)心肌旋轉蛋白 (Troponin I) 對心肌受損具有特異性及敏感性
(C)心電圖出現 Q 波表示心肌受損在表層
(D)心電圖 ST 間段及 T 波的改變可以協助判斷心肌是缺氧、缺血或壞死
- 27 有關裝置植入式自動心律轉換去顫器 (AICD) 病人居家護理指導之敘述，下列何者錯誤？
(A) AICD 發出電擊時，若觸摸病人可能有觸電感
(B)發生打嗝不停的情形時，可以多飲水或重複憋氣
(C)術後 4~6 週內患肢避免提重物以及劇烈肩部運動
(D)可使用微波爐、電鍋等加熱電器用品，但應避免核磁共振檢查
- 28 有關心房纖維顫動病人服用 Warfarin 之護理指導，下列何者錯誤？
(A)拔牙前，須告知醫師目前使用 Warfarin 治療心律不整
(B)避免食用深綠色食物，以免降低藥效
(C)避免補充黑木耳、銀杏等食品，以免增強藥效
(D)若忘記服藥，需於次日服用雙倍劑量，以維持藥物濃度
- 29 有關心律不整病人照護之敘述，下列何者錯誤？
(A)在施行整流術前，應給與 Valium，以減少病人焦慮與不適
(B)裝置心臟節律器的病人，應隨身攜帶心臟節律器之識別卡
(C)心室上心搏過速 (SVT) 的病人，可教導伐氏操作法 (Valsalva's maneuver)
(D)服用 Warfarin 的病人，需定期監測部分凝血活酶時間 (PTT)

- 30 下列何者為骨性關節炎的症狀和徵象？
(A) 35 歲女性，雙手呈現尺側偏移及天鵝頸
(B) 45 歲男性，全身倦怠、肌肉痠痛、發燒、體重減輕
(C) 30 歲女性，對稱性的關節受侵犯
(D) 40 歲男性，X 光顯示關節間隙減少及骨贅形成
- 31 靜脈注射不當造成血管紅、腫、痛是屬於下列何種血管問題？
(A)靜脈曲張 (B)血栓性靜脈炎 (C)靜脈功能不全 (D)靜脈鬱滯性潰瘍
- 32 下列何者最適合接受機械性人工心瓣膜置換術？
(A)出血傾向者 (B)計畫生育婦女 (C) 50 歲的停經婦女 (D) 80 歲的女性老人
- 33 接受同步化學放射治療 (CCRT) 的病人，其抽血報告顯示 WBC 3000/ μ L、seg 20%、band 5%、monocyte 12%、Hb 10.5 g/dL、platelet 50000/ μ L，下列敘述何者錯誤？
(A)發燒時避免使用 NSAID 退燒 (B)轉至負壓式單人病房保護隔離
(C)避免攝食未妥善處理之生鮮蔬果 (D)注射 G-CSF 以提升嗜中性白血球數
- 34 有關非何杰金氏淋巴瘤預後不佳的因素，下列何者正確？①年齡小於 50 歲 ②身體功能狀態不佳 ③淋巴結外侵犯 ④血紅素值小於 12 g/dL
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 35 有關瀰漫性血管內凝血的敘述，下列何者正確？①與感染有關 ②常出現凝血症狀 ③檢查時纖維蛋白原下降 ④常出現出血症狀
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 36 有關異體周邊血液幹細胞移植之敘述，下列何者正確？
(A)捐贈者捐贈時不需施打白血球生成激素
(B)受贈者的人類白血球抗原 (HLA) 配對不需完全吻合
(C)宿主較易有慢性移植物抗宿主反應 (GVHD)
(D)宿主不易受病毒感染
- 37 周女士，52 歲，本身有高血壓及乳癌家族史，有抽菸，在一次回診時表示自己年紀越來越大，很擔心會跟媽媽一樣罹癌，下列建議何者錯誤？
(A)不用過度擔心，若自覺乳房有異狀再做乳房攝影
(B)鼓勵戒菸、轉介戒菸門診
(C)將運動融入生活，可以走樓梯代替搭電梯等
(D)適度日曬，促進維生素 D 合成
- 38 有關骨髓抽吸檢查之敘述，下列何者錯誤？
(A)執行時可採局部麻醉
(B)對於無法解釋的肝脾腫大不具診斷功能
(C)成人常見抽吸部位可在第 2~3 肋間胸骨處或前後腸骨嵴
(D)檢查結果可決定癌症分期，作為治療依據

- 39 有關癌症分期系統類型之敘述，下列何者錯誤？
(A)治療前的臨床分期，可以 cTNM 表示
(B)手術後切除病理組織做的分期，可以 sTNM 表示
(C)復發或再次治療，可以 rTNM 表示
(D)治療後分期，可用 ycTNM 表示
- 40 有關癌症病人血小板減少症之處置，下列何者正確？
(A)可給與非類固醇抗發炎藥物緩解疼痛
(B)必要時輸注凝血因子避免自發性出血
(C)給與 Bisacodyl supp 避免便秘而閉氣用力
(D)天冷時鼻黏膜塗擦凡士林保濕
- 41 有關良性腫瘤及惡性腫瘤之敘述，下列何者正確？
(A)惡性腫瘤因沒有包膜，手術治療成效佳
(B)不管良性或惡性腫瘤，細胞排列皆不規則
(C)良性腫瘤以浸潤方式侵入周圍組織
(D)良性腫瘤若生長於密閉空間，會阻塞管腔產生各種症狀
- 42 下列那一類白血病的預後最好？
(A) T 細胞型急性淋巴性
(B) B 細胞型急性淋巴性
(C)血小板缺乏的慢性淋巴性
(D)芽細胞期慢性骨髓性
- 43 護理之家發生火災，許多住民吸入性灼傷，下列緊急處置，何者正確？
(A)維持呼吸道通暢並由面罩給 100% 的氧氣吸入
(B)發生呼吸窘迫時不適合進行插管
(C)安排病人採平躺側臥
(D)建立由口鼻腔進入的液體輸液通道
- 44 王同學騎機車不慎與汽車擦撞引發機車起火，右小腿外側有 15 公分×7.5 公分的皮膚受損，診斷為深二度燒傷。下列臨床表徵何者正確？①皮膚變紅無水泡 ②皮膚呈灰白色有水泡 ③劇烈疼痛感 ④汗腺及毛囊完整 ⑤表皮及真皮層受損
(A)①③④ (B)①④⑤ (C)②③⑤ (D)②④⑤
- 45 有關皮膚癌的預防或處置，下列敘述何者錯誤？
(A)長時間暴露陽光下，無需重複塗抹 SPF15 以上的防曬乳液
(B)陰天也要採取防曬措施
(C)皮膚病灶變大或發生色素沉著現象應立即就醫
(D)造成曬傷時可以用冷水浸泡消褪
- 46 有關膠帶等黏性產品使用之敘述，下列何者正確？
(A)移除膠帶時，應垂直、快速才不會痛太久
(B)膠帶造成皮膚的損傷好發在嬰幼兒和水腫病人
(C)移除膠帶時需支撐邊緣皮膚，以 180 度逆毛方向移除
(D)使用膠帶前，可以在皮膚上塗抹優碘以增加黏性
- 47 有關細胞毒殺過敏反應之敘述，下列何者錯誤？
(A)參與此類過敏反應的抗體是 IgG 或 IgM
(B) Rh 血型不合屬此類過敏反應
(C)參與此類過敏反應的細胞是吞噬細胞及殺手細胞
(D)紅血球、白血球、血小板的作用不受此類過敏反應影響

- 48 有關器官移植前的組織配對，降低排斥反應之檢驗項目，不包含下列何者？
(A) ABO 及 Rh 血型 (B) 人類白血球抗原 (C) 交叉配對試驗 (D) 梅毒血清檢查
- 49 有關全身性紅斑性狼瘡病人之護理指導，下列何者錯誤？
(A) 外出時，應戴太陽眼鏡及帽子，著長袖上衣及長褲，以避免日曬
(B) 女性病人可使用保險套或避孕藥來避孕
(C) 當處於壓力、生病或有感染時，應告知醫師以調整藥物劑量
(D) 關節疼痛時，可應用冷熱敷來緩解
- 50 有關後天免疫缺乏症候群 (AIDS) 病人出現伺機性感染之敘述，下列何者正確？
(A) CD4 細胞數值在 350 cells/ μ L 以下容易發生
(B) 以口腔念珠球菌感染最為常見
(C) 巨細胞病毒 (CMV) 感染的治療可服用 Zovirax
(D) 肺囊蟲肺炎感染會造成病人乾咳、用力咳嗽症狀
- 51 協助醫師拔除胸管時，應指導病人採取下列何種呼吸方式？
(A) 緩慢吸吐氣 (B) 哈氣 (C) 快速吸吐氣 (D) 深吸氣後閉氣
- 52 有關慢性咳嗽病人進行支氣管鏡檢查後，下列護理措施何者最適宜？
(A) 床頭抬高至 80~90 度 (B) 禁食直到作嘔反射恢復
(C) 臥床休息至少 4 小時 (D) 咳出微量血絲痰應立即通知醫師
- 53 全球慢性阻塞性肺疾病倡議組織 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD) 將 COPD 嚴重度分為 GOLD 1~4 級，下列何者為分級依據？
(A) 肺餘容積 (RV) (B) 第一秒用力呼氣容積 (FEV₁)
(C) 血氧濃度 (SaO₂) (D) 急性惡化的次數
- 54 有關病人的肺部身體評估，下列結果何者異常？
(A) 吸氣時胸廓對稱性往外擴張 (B) 肺部基底部出現反響音
(C) 下肺區出現支氣管呼吸音 (D) 胸廓左右徑大於前後徑
- 55 張先生患有多重抗藥性結核病 (MDR-TB)，表示其對何種藥物產生抗藥性？①Ethambutol ②Isoniazid
③Pyrazinamide ④Rifampin
(A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④
- 56 有關接受肺葉切除手術病人之護理，下列敘述何者正確？
(A) 術前接受肺功能檢查，可作為評估術後咳嗽能力的指標
(B) 術後教導避免肩部與手臂運動，以利傷口癒合
(C) 採肺葉切除手術，術後應臥向患側，以利健側肺部氣體交換
(D) 術後使用誘發性肺量計 (incentive spirometry)，可預防肺塌陷
- 57 病人有心衰竭病史，因車禍造成左側肋骨骨折與氣血胸，目前出現急性呼吸衰竭的情形，下列護理措施何者最不適宜？
(A) 給與止痛藥，避免肺擴張不全，降低通氣量 (B) 給與氧氣，FiO₂ 60%
(C) 給與全血，避免血色素低下，影響攜氧量 (D) 建議補充低醣、高蛋白食物
- 58 有關透析治療之適應症，下列何者不適宜？
(A) 急性高血鉀 (B) 急性肺水腫 (C) 急性腎衰竭利尿期 (D) 急性巴比妥類中毒

- 59 有關膀胱炎之敘述，下列何者最適宜？
(A)尿液檢驗值每毫升尿液菌數大於 10^5 個表示正常
(B)服用抗生素 Neomycin，可給與維生素 C 酸化尿液
(C)反覆性泌尿道感染須連續使用 3~5 天抗生素
(D)指導病人每天攝取至少 3,000 c.c.以上液體
- 60 有關泌尿道感染病人應多攝取之酸灰性食物，下列何者錯誤？
(A)肉類、蛋 (B)燕麥、玉米 (C)梅子、李子 (D)牛奶、柑橘
- 61 有關壓力性尿失禁之敘述，下列何者錯誤？
(A)導因為膀胱肌肉張力欠佳 (B)好發於多產次婦女
(C)可能與雌激素缺乏有關 (D)肥胖或搬重物會加重症狀
- 62 有關逆行性腎盂造影術之敘述，下列何者正確？①檢查前評估病人有無鋇劑過敏病史 ②檢查前衛教病人勿排空膀胱 ③此檢查使用的顯影劑不會進入血流 ④檢查後監測病人有無尿瀦留、感染、血尿情形
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 63 有關抗利尿激素分泌不當症候群 (SIADH) 病人之臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)低血清鈉 (B)低尿量 (C)低血漿滲透壓 (D)低尿比重
- 64 王先生的動脈血液氣體分析判讀結果為未代償性呼吸性酸中毒，下列敘述何者正確？
(A) pH 7.27、PaCO₂ 50 mmHg、HCO₃⁻ 25 mmHg、PaO₂ 80 mmHg
(B) pH 7.30、PaCO₂ 52 mmHg、HCO₃⁻ 30 mmHg、PaO₂ 81 mmHg
(C) pH 7.39、PaCO₂ 48 mmHg、HCO₃⁻ 32 mmHg、PaO₂ 89 mmHg
(D) pH 7.37、PaCO₂ 47 mmHg、HCO₃⁻ 31 mmHg、PaO₂ 81 mmHg
- 65 有關輸尿管結石常見之臨床症狀，下列何者錯誤？
(A)腰部、會陰疼痛 (B)噁心、嘔吐 (C)頻尿、尿急 (D)寒顫、發燒
- 66 吳先生，85 歲，因全身水腫，呼吸喘至急診求治，診斷為急性腎衰竭，下列敘述何者正確？
(A)腎臟超音波檢查結果雙側腎臟大小有變小 (B)測量 24 小時尿量約 350 c.c.，此為少尿型腎衰竭
(C)出現高血鉀且心電圖出現 T 波低而寬 (D)可能因為前列腺肥大導致腎性急性腎衰竭
- 67 有關造成糖尿病病人血糖過低之促因，下列何者正確？
(A) Glipizide 服用過量 (B)健走運動時間減少
(C)近期工作壓力增加 (D)近日上呼吸道感染
- 68 一位 18 歲女性主訴最近發現全身皮膚起紅疹、口腔潰瘍、關節疼痛、偶有頭痛，另血紅素及血小板降低、抗核抗體升高，下列何者為其最可能之診斷？
(A)痛風性關節炎 (B)全身性紅斑性狼瘡
(C)後天免疫缺乏症候群 (D)類風濕性關節炎
- 69 下列何種荷爾蒙分泌過多會導致康氏症候群 (Conn's syndrome)？
(A)糖皮質酮 (B)醛固酮 (C)腎上腺素 (D)抗利尿激素

- 70 陳小姐因甲狀腺機能亢進，接受抗甲狀腺藥物硫醯胺類（thioamides）與碘製劑（iodine）治療，有關其藥物治療之敘述，下列何者正確？
(A)給與大劑量硫醯胺類藥物，隨著血清 T3 和 T4 數值降低而減量，待正常就可以停藥
(B)碘製劑有顆粒球與血小板減少的副作用，第一次給藥前應先測白血球與血小板數目
(C)服用硫醯胺類藥物的目的是為了減少甲狀腺腺體的血管分布
(D)碘製劑使用不宜超過 2 週，以免造成甲狀腺逸脫，使大量甲狀腺素進入循環加重症狀
- 71 承上題，陳小姐近期藥物治療反應不佳而入院接受甲狀腺切除術，有關甲狀腺切除手術，下列何者正確？①為維持正常的甲狀腺功能，一般採用次全甲狀腺切除 ②出血、聲門水腫、急性呼吸道阻塞為常見的術後合併症 ③術後聲音沙啞是因雙側喉返神經受傷所致 ④術後需評估病人有無肌肉抽搐之甲狀腺功能低下表徵
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 72 承上題，有關陳小姐術後之護理指導，下列敘述何者正確？
(A)建議採平躺臥姿，以避免牽拉傷口縫線
(B)教導避免深呼吸、咳嗽，以防牽拉傷口造成出血
(C)鼓勵攝取冰涼液狀食物，以減輕傷口不適
(D)建議攝取高熱量、低蛋白質及高碘的食物
- 73 有關副甲狀腺功能低下之臨床表徵，下列何者正確？①嗜睡 ②高血鈣 ③骨質耗損加劇 ④白內障 ⑤高血磷
(A)①③⑤ (B)①④⑤ (C)②③④ (D)②③⑤
- 74 下列何種情況可能會導致特魯索氏（Trousseau）與沃斯德克氏（Chvostek）徵象皆呈陽性反應？①低血鈣 ②低血鉀 ③低血糖 ④副甲狀腺功能低下症
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 75 有關急救使用手壓式甦醒球面罩（Ambu Bag mask）給與人工呼吸的敘述，下列何者正確？
(A)當病人 SPO₂ 95%時應該使用
(B)面罩較尖的部位應對準病人下巴
(C)氧氣流速調整至 12~15 公升／分鐘
(D)一手使面罩密合病人口鼻，另一手應儘量完全壓扁球囊
- 76 有關施行心肺復甦術（CPR）成功徵象的敘述，下列何者正確？①四肢有動作反應 ②有自發性呼吸 ③刺激眼瞼會眨眼 ④瞳孔對光反射固定
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 77 下列何類休克有皮膚潮紅、溫暖的臨床徵象？①低血容性 ②敗血性 ③心因性 ④神經性
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 78 有關敗血症生理病理機轉之敘述，下列何者正確？①細菌感染引發腫瘤壞死因子活化產生微小血栓 ②微生物侵入人體造成微血管通透性增加、全身循環血量增加 ③全身代謝狀態升高造成細胞耗氧量增加，但組織血流灌注降低，產生代謝性酸中毒 ④因心臟受刺激出現血壓上升，可能引發尿量增加
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 79 下列何者不需採取腸道隔離？
(A)痢疾 (B)傷寒 (C)腮腺炎 (D)霍亂
- 80 有關登革熱病人的隔離防護措施，下列何者正確？
(A)接觸隔離 (B)呼吸道隔離 (C)腸道隔離 (D)血液和體液的防護