

## 112 年第一次專門職業及技術人員高等考試

### 護理師

### 產兒科護理學

1 有關分娩期的支持性照護措施，下列何者較不適當？

(A)提供待產婦女一致性常規醫療照護

(B)教導待產婦女及伴侶生產的相關知識

(C)維持生產環境的燈光昏暗

(D)允許待產婦女自由選擇下床走動

2 下列何種情況之孕婦最需要協助轉介遺傳諮詢？

(A)姻親通婚者

(B)親妹有血友病

(C)超音波發現胎兒過大

(D)先生有 B 型肝炎

3 有關胎兒發育的描述，下列何者正確？

(A)胎兒最內層的胚胎膜是羊膜，會與子宮的基底蛻膜形成胎盤

(B)受孕後囊胚會立即植入子宮內膜，稱為著床，通常部位發生在子宮頸內口

(C)受精後第 2~3 週由胎盤提供胚胎養分

(D)黃體退化後，胎盤取代其功能分泌雌性素及黃體素

4 有關懷孕時因雌性素增加，造成孕期常見的不適，下列敘述何者正確？

- (A)使膀胱鬆弛，產生頻尿
- (B)使腸胃道活動力降低，產生心灼熱感
- (C)使陰道黏膜增生，陰道分泌物會增加
- (D)使平滑肌放鬆，導致孕期容易便秘

5 陳女士，懷孕 32 週，預計採陰道生產。下列何項為最有效的伸展會陰部肌肉之產前運動？

- (A)腰背伸展運動
- (B)腹部強化運動
- (C)蹲踞運動
- (D)抬腿運動

6 蔡女士 30 歲，懷孕 14 週，孕前身體質量指數(BMI) 30 kg/m<sup>2</sup>，下列何者為最優先安排的檢查？

- (A)乙型鏈球菌
- (B)血糖相關檢驗
- (C)胎盤功能評估
- (D)無壓力試驗

7 李女士懷孕 14 週，產檢時詢問：「我從小就吃素，現在懷孕了，我在飲食上要注意什麼嗎？」下列回應何者較適當？

- (A)素食易缺乏維生素 A，可以多攝取深色蔬菜

(B)素食易缺乏葉酸，可以多攝取綠色蔬菜

(C)素食易缺乏維生素 B12，可以多攝取海苔海藻

(D)素食易缺乏鈣，可以多攝取牛奶起司

8 懷孕期愛滋血清試驗中，對於初篩連續兩次陽性反應之個案，衛生單位應聯繫孕婦進行下列那項措施？

(A)以酵素免疫分析法(Enzyme Immunoassay, EIA)及核酸檢驗(Nucleic Acid Test, NAT)再次確認

(B)以顆粒凝集法(Particle-Agglutination Method, PA)及抗體免疫層析(Immunochromatographic Test)再次確認

(C)以核酸檢驗(Nucleic Acid Test, NAT)及抗體免疫層析(Immunochromatographic Test)再次確認

(D)不須再檢測直接給予藥物治療

9 王女士，因卵巢過度刺激症候群(Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS)住院安胎，腹水嚴重相當不舒服，且住院很多事不方便，但會說這是值得的，會努力配合治療。王女士正進行那些懷孕期發展任務(maternal task)？1.確保自己及胎兒在懷孕中能安全順利 2.使重要家人接受新生兒 3.學習貢獻自己 4.與胎兒連成一體

(A) 1.2.

(B) 2.3.

(C) 1.3.

(D) 3.4.

10 有關衛生福利部國民健康署對婦女妊娠期體重增加之建議，下列敘述何者正確？

(A)孕前身體質量指數(BMI) < 18.5 的孕婦，總體重增加應控制在 7~11 公斤

(B)孕前身體質量指數(BMI) 18.5~24.9 的孕婦，總體重增加需 11.5~16 公斤

(C)雙胞胎孕婦之建議增加總體重量為單胞胎之 2 倍

(D)孕前身體質量指數(BMI)正常的孕婦，第二、三妊娠期體重宜增加 0.3 公斤 / 週

11 張女士，G2P1，懷孕 40 週，子宮頸口擴張 8 公分，變薄 90%，如果出現宮縮強且胎頭迅速下降想用力，下列護理措施何者較不恰當？

(A)請採哈氣，喘息呼吸

(B)協助側躺姿勢，減輕疼痛

(C)指導產婦用力，保護會陰

(D)採跪趴姿勢，減少用力感受

12 陰道分娩過程中，胎盤以暗紅色的粗糙面被牽引出陰道。有關此胎盤娩出的敘述，下列何者正確？1.希氏法(Schultze mechanism)娩出 2.鄧氏法(Duncan mechanism)娩出 3.較容易發生剝離不完全 4.較少發生剝離不完全

(A) 1.3.

(B) 2.3.

(C) 1.4.

(D) 2.4.

13 有關待產期間施行陰道內診的敘述，下列何者錯誤？

- (A)過程中須注意無菌原則
- (B)以食指及中指深入陰道內檢查
- (C)於子宮收縮時進行檢查
- (D)產婦採大腿彎曲且外展的姿勢

14 有關胎心率變異性減速的敘述，下列何者正確？

- (A)胎心率在宮縮高峰時開始變慢，宮縮結束後則恢復到基準
- (B)進行陰道內診確認臍帶是否受壓迫，必要時協助左側臥
- (C)因子宮胎盤灌注過度導致胎血負荷過重所致
- (D)為第二產程期間的正常現象，持續觀察即可

15 陳女士因陣痛入院待產，目前子宮頸口開 2 公分，Oxytocin 使用，宮縮每 6~7 分鐘一次，每次 20~30 秒，宮縮壓力：40~50 mmHg。主訴陣痛厲害無法忍受，下列措施何者最適當？

- (A)向陳女士解釋，連絡醫師給予腰椎硬膜外麻醉止痛
- (B)簽同意書，並協助醫師準備腰椎硬膜外麻醉止痛之用物
- (C)根據陳女士宮縮壓力情形，給予按摩放鬆技巧以減輕疼痛
- (D)向陳女士解釋，目前產程無法採用腰椎硬膜外麻醉止痛，可調快 Oxytocin

16 第一產程活動期的待產婦，每 3 分鐘宮縮 1 次，每次持續 45 秒，個案在宮縮的休息期，胎心率为 90 bpm，下列何項護理措施較適當？

- (A)立即通知醫師

- (B)正常、可繼續監測胎心率
- (C)鼓勵個案在每次宮縮時繼續用力向下
- (D)教導個案呼吸技巧

17 有關胎心音監測的敘述，下列何者正確？

- (A)杜卜勒(Doppler)超音波可用來執行連續性監測胎心音
- (B) Leopold 四段腹查的第三段觸診為確認胎背位置
- (C)持續性的胎心音監測可得知胎心率基準線與週期性變化
- (D)高危險待產婦女與胎兒，在第一產程的潛伏期應每 1 小時評估一次胎心率

18 剖腹產時，為減少藥物對胎兒的副作用，宜採用何種麻醉方式？

- (A)靜脈注射麻醉劑法
- (B)腰椎硬膜外麻醉法
- (C)陰部阻斷法
- (D)吸入性麻醉法

19 丁女士，使用催產素引產，以每小時 9 c.c.靜脈滴注，胎兒監視器顯示變異性減速，此時最優先之處置為何？

- (A)停止催產素
- (B)協助下床活動
- (C)準備剖腹產
- (D)密切觀察，不須特別處理

20 有關母乳中各種營養素對於新生兒成長作用之敘述，下列何者錯誤？

- (A)寡糖可避免致病菌黏附在腸胃道用以避免腸胃道疾病
- (B)中、長鏈不飽和脂肪酸有助於視網膜的發展
- (C)乳鐵蛋白能與鐵結合，避免鐵質被腸道細菌利用
- (D)酪蛋白可加強脂溶性維生素在腸胃道吸收的比例

21 黃女士 G2P2，大寶剛剛滿 2 歲，今天預計出院回家，產婦擔心同時照顧 2 個孩子會心力交瘁，下列何者有關黃女士的親子依附關係出現時，最需要特別關注與持續追蹤？

- (A)大寶睡覺時，抱著新生兒目不轉睛盯著看
- (B)同時以乳房安撫大寶及新生兒
- (C)在新生兒睡覺時，唸書給大寶聽
- (D)除了哺餵新生兒，其他時間都請月嫂照顧

22 坐月子期間純母乳哺餵的母親表示：「為什麼寶寶一喝完奶就解便、大便總是稀稀糊糊的？」下列護理指導何者最適當？

- (A)最可能是新生兒對母乳過敏，建議改用水解配方奶
- (B)後奶含豐富乳糖，乳糖刺激新生兒胃結腸反射，而產生帶酸味的稀糊便
- (C)因坐月子期間母親取過多高脂食物而影響奶水成分，間接導致稀糊便
- (D)母乳水分含量高，新生兒胃結腸反射明顯，來不及將水分吸收而產生稀糊便

23 有關剖腹產術前及術後之護理措施，下列何者正確？

- (A)手術前 4 小時禁食固體食物

(B)皮膚剃毛從肚臍往下至大腿上二分之一

(C)如採區域性麻醉，術後不必等排氣即可進食

(D)一般留置導尿管，點滴移除後才移除

24 吳女士，G1P1，產後進行親子同室，其先生抱起寶寶，眼神專注凝視寶貝，並輕聲細語說：「我是爸爸，叫爸爸。」下列描述父親與新生兒發展依附之行為，何者最適當？

(A)肌膚接觸(skin-to-skin contact)

(B)袋鼠護理(kangaroo care)

(C)準父親自信(confident of expectant father)

(D)全神貫注(engorgement)

25 王女士，28 歲第一胎，產後 2 個月，月經尚未來，採純母乳哺餵。下列何項避孕措施最不推薦？

(A)口服避孕藥

(B)子宮內避孕器

(C)保險套

(D)泌乳無月經避孕法

26 有關產後泌尿系統的變化，下列何者為正常現象？

(A)尿液中人類絨毛膜促性腺激素(hCG)於產後 1 週消失

(B)蛋白尿持續 3 週

(C)血尿持續 3 週

(D)產後利尿現象持續 6 週

27 產後 3~10 天，產婦的注意力集中在母親職責的學習及自己身體功能的恢復，這是符合魯賓(Rubin)提出的那一期？

(A)調適期(Adaptative Phase)

(B)接受期(Taking-in Phase)

(C)緊執期(Taking-hold Phase)

(D)釋放期(Letting-go Phase)

28 有關產婦乳腺炎的評估及照護，下列敘述何者錯誤？

(A)常發生於產後 1 週內

(B)通常發生於單側乳房

(C)最常見的致病菌為金黃色葡萄球菌

(D)指導正確的哺餵母乳可預防其發生

29 正常新生兒出生 4~6 小時內，最主要的能量來源為何？

(A)葡萄糖

(B)胺基酸

(C)脂肪酸

(D)棕色脂肪

30 有關維持新生兒出生即刻體溫穩定的措施，下列何者不適當？

(A)將接觸新生兒的布單事先預熱

(B)擦乾新生兒後進行母嬰肌膚接觸

(C)使用空調或是加溫設備維持室溫

(D)新生兒出生後應立即沐浴維持體溫

31 一位懷孕 28 週妊娠糖尿病孕婦受胰島素治療，其施打的胰島素劑量隨著妊娠週數的增加也逐漸增加。胰島素的需求量與下列何項荷爾蒙的分泌增加有關？

(A)泌乳激素(Prolactin)

(B)人類胎盤泌乳激素(human Placental Lactogen, hPL)

(C)人類絨毛膜促性腺激素(human Chorionic Gonadotropin, hCG)

(D)促腎上腺皮質素(Andrenocorticotrophic hormone, ACTH)

32 有關胎盤碎片殘留所致產後出血的敘述，下列何者正確？

(A)希氏法(Schultze mechanism)娩出胎盤者，較易有胎盤小碎片殘留子宮

(B)是指分娩第二產程處理欠妥，使得部分胎盤碎片殘留子宮

(C)胎盤小碎片殘留常是晚期產後出血之生因

(D)應採雙手壓迫子宮法，促使子宮收縮將胎盤碎片排出

33 當產科急症造成瀰漫性血管內凝血(Disseminated Intravascular Coagulation, DIC)時，

下列檢驗數值何者正確？1.凝血酶原時間(PT)、部分凝血酶原時間(PTT)延長 2.D-dimer 數值下降 3.血小板數值下降 4.纖維蛋白原(fibrinogen)數值上升

(A) 1.2.

(B) 1.3.

(C) 2.3.

(D) 3.4.

34 張女士，懷孕 8 週，主訴陰道點狀出血、腹部微痛，超音波檢查子宮頸口未開，可能為下列何種情形？

(A) 迫切性流產(Imminent abortion)

(B) 先兆性流產(Threatened abortion)

(C) 不完全流產(Incomplete abortion)

(D) 完全性流產(Complete abortion)

35 承上題，超音掃描確認胎兒心跳正常，此時最適當的照護措施為何？

(A) 臥床休息，給予黃體素

(B) 給予安胎藥 Yutopar 服用

(C) 建議做子宮頸環紮術

(D) 投予抗生素預防感染

36 郭先生的精液分析結果如下：精液量約 7 c.c.，精子濃度 800 萬/mL，射精後 42% 的精蟲仍具活動力，正常型態的精蟲為 50%。有關其結果之敘述，下列何者正確？

(A) 結果一切正常

(B) 精子畸形症

(C) 精液過少症

(D) 精蟲減少症

37 有關絨毛膜癌的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 約有 50% 葡萄胎惡性病變衍生而來
- (B) 常見轉移之部位為肺臟
- (C) 血清 hCG 值升高是診斷絨毛膜癌最重要的依據
- (D) 以手術治療為主，放射線治療為輔

38 王女士有打噴嚏、咳嗽、大笑所引起無法自主控制膀胱的漏尿，是屬於下列那種尿失禁？

- (A) 急迫性尿失禁
- (B) 姿勢性尿失禁
- (C) 壓力性尿失禁
- (D) 滿流性尿失禁

39 有關尖型濕疣(菜花)的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 由人類乳頭瘤病毒(HPV)16 與 18 型所引起
- (B) 感染後約在 2 星期至 8 個月內出現症狀
- (C) 常發生於生殖器、肛門等部位
- (D) 治療方法包含雷射、液態氮、藥物等方法

40 李女士 40 歲，因子宮內膜癌進行全子宮和雙側輸卵管卵巢切除術，出院前的護理指導，下列何者正確？1. 第 1 年每 6 個月回診一次 2. 不可抬過重的物品 3. 告知可能的更年期症狀 4. 術後半年避免性行為

(A) 1.2.

(B) 1.4.

(C) 2.3.

(D) 3.4.

41 面對自閉症(Autism)病童住院，下列護理措施何者最適當？

(A)多與病童溝通互動，以利建立護病關係

(B)採一對一的照護，且避免過度視聽騷擾

(C)發現病童有重複固著行為時，要出面制止

(D)避免病童有暴怒行為，不須事先告知說明

42 以「家庭為中心的照護」應用於加護病房的照顧，下列敘述何者正確？

(A)鼓勵並支持病童父母或手足有機會時參與共同照顧

(B)加強管理，嚴格規定父母會客時間，以預防感染

(C)為減少交互感染之風險，應儘量避免家人探視

(D)兒童、青少年住院，醫師應以母作為病情溝通與解釋對象

43 李小妹，2 歲 8 個月，屬於李小妹遊戲發展特點，下列敘述何者正確？

(A)遊戲過程獨自玩弄玩具，自得其樂，不重視玩伴

(B)遊戲過程與玩伴互換玩具，但各玩各的，無合作行為

(C)聯合遊戲過程，缺乏遊戲規則，亦無分工合作行為

(D)遊戲過程與玩伴合作、競爭，訂立遊戲規則與團體目標

44 針對嬰幼兒生長發展情況之敘述，下列何者錯誤？

(A) 2 歲身高約成人身高的一半

(B) 前囟門約 1 歲半時關閉

(C) 1 歲時腎絲球過濾率達成人標準

(D) 觸覺是感覺器官中最早發育的

45 嬰幼兒誤食色彩鮮豔的糖果紙、廣告紙、顏料等，容易引起下列何種物質的中毒，造成中樞神經系統的損傷？

(A) 鉛

(B) 鐵

(C) 銅

(D) 塑化劑

46 有關兒童性虐待的常見表徵，下列敘述何者錯誤？

(A) 外陰部、肛門、嘴部或喉嚨處有撕裂傷瘀傷腫脹

(B) 肢體瘦小、皮下脂肪不足的營養不良現象

(C) 睡眠紊亂、害怕獨處、同儕關係薄弱

(D) 反覆的尿道感染及解尿困難

47 有關兒童氣質評估之敘，下列何者正確？

(A) 反應與閾高的嬰兒，尿布不乾淨就會哭鬧不安

(B) 堅持度高的嬰兒，容易受到外界干擾而影響

(C)趨避性高的嬰兒，初次接受或拒絕人事物的態度明顯

(D)反應強度是指引起孩子反應所需最小刺激量

48 有關新生兒篩檢的敘述，下列何者錯誤？

(A)新生兒出生後須滿 48 小時才能採檢

(B)採檢前須熱敷足部 3~10 分鐘

(C)以 75%酒精棉球消毒穿刺部位

(D)手執濾紙接取穿刺後流出的第一滴血

49 強強，3 歲，因車禍住加護病房，剛住院時一直哭泣，對著護理師不斷地哭著說：「走

開，我要媽媽.....」。根據兒童早期分離焦之反應屬於以下那一個階段？

(A)失望期

(B)去依戀期

(C)關係重建期

(D)抗議期

50 有關不同年齡層兒童口服用藥，下列敘述何者正確？

(A)建議嬰兒抱起或協助採半坐臥，每次建議口服量為 5mL

(B)嬰兒若是服用藥粉，建議將藥粉溶入水中再以餵奶器滴入口中

(C)幼兒服藥反抗時，建議讓其躺下並壓其下巴張開口以利服藥

(D)若 5 歲以下病童選擇吞服藥丸，建議藥丸置舌尖以利吞嚥

51 翔翔，9 歲，因妹妹癌末瀕臨死亡住院，以下對翔翔的照護措施何者較不適當？

(A)安排他在適當時機探望妹妹

(B)鼓勵他：「你已經是大孩子了，一切要自己忍耐下來」

(C)請學校老師協助提供他關懷與支持

(D)將他同時納入護理照護計畫

52 有關 FLACC (face, legs, activity, cry and consolability)疼痛量表，下列敘述何者錯誤？

(A)可用來評估 4 個月大的嬰兒

(B)分數越高表示越疼痛

(C)雙腳持續踢動評估分數為 2

(D)每項評估分數分為 1 與 2 二等級

### ◆ 老師解析

(A) 可用來評估 4 個月大的嬰兒

→ 評估兩個月到七歲幼兒無法標達疼痛程度

(D)每項評估分數分為 1 與 2 二等級

→ 總共分為三級：零、一、二

53 有關早產兒經口餵食的發展照護原則，下列敘述何者錯誤？

(A)早產兒出現安靜清醒期，並出現飢餓暗示行為，例如尋乳行為、吸吮動作即可開始準備

(B)早產兒出現壓力暗示行為，例如疲倦、噎奶、呼吸暫停、發紺，需減緩或停止餵食

(C)對於妊娠週數低及低體重的早產兒，餵食時間應延長至 60 分鐘以減少壓力

(D)觀察呼吸及膚色，調整奶瓶位置及流速，視情況暫停餵食並刺激呼吸

54 有關早產兒視網膜病變的高危險群與症狀，下列敘述何者不適當？

(A)通常出現在出生體重在 1,500 公克以下

(B)長期使用呼吸器與高濃度氧氣暴露為危險因子

(C)第一、二期為輕度病變，會自行好轉，一般不需治療，少有視力障礙

(D)視網膜完全剝離，可經由鞏膜扣壓術、玻璃體內切除術獲得治癒

55 吳小弟血型為 B 型，因血型與 O 型的母親不合而造成溶血，下列敘述何者正確？

(A)「ABO 血型不合」的黃疸會比「Rh 因子不合」者嚴重

(B)「ABO 血型不合」通常發生在第二胎以後的新生兒

(C)有較高機會發生聽力損傷、發展遲緩等後遺症

(D)吳小弟需要換血，使用血品為 B 血型

56 有關提供慢性病兒童家庭之持續性及全面性照護的護理措施，下列敘述何者較不適當？

(A)對父母親的反應及潛在需求，要有敏感度

(B)善用傾聽技巧，且採用易於理解的語言，提供醫療訊息

(C)主動提供共享資訊，包含有關社會資源的訊息

(D)為了讓主要照顧者全面了解，應一次提供疾病照護的所有訊息

57 人類免疫缺乏病毒(Human Immunodeficiency Virus, HIV)帶原的青少年之護理指導，

下列敘述何者錯誤？

(A)指導絕對不可以發生性行為，以免傳染給他人

(B)家人協助處理切割的傷口時，應戴手套

(C)提醒感染 HIV 者不要捐血，以避免傳染疾病

(D)教導環境設備污染時，以 0.05%漂白水擦拭

58 有關瀕死病童的生理變化，下列敘述何者錯誤？

(A)尿量漸減

(B)陳施氏呼吸(Cheyne-Stokes respiration)

(C)視力減退，聽覺最早消失

(D)心跳慢且弱

59 有關猩紅熱的臨床表徵，下列敘述何者正確？

(A)突發性高燒，盤尼西林治療 24 小時內體溫降至正常

(B)舌頭最初為紅色乳突狀的紅色草莓樣舌，4~5 天後轉為白色草莓樣舌

(C)皮疹最早出現在軀幹、四肢、前額、臉頰

(D)皮疹為針點狀紅疹，受壓迫時皮疹更明顯

## ◆ 老師解析

(A) 突發性高燒，盤尼西林治療 24 小時內體溫降至正常

→是 A 群 beta 溶血性鏈球菌，盤尼西林抗生素治療

(B) 舌頭最初為紅色乳突狀的紅色草莓樣舌，4~5 天後轉為白色草莓樣舌

→初期一到兩天白色草莓舌，四到五天白色脫落才會變成紅色

(C) 皮疹最早出現在軀幹、四肢、前額、臉頰

→皮疹由頸部、腋下、鼠蹊部開始；24 小時內變成全身性

(D) 皮疹為針點狀紅疹，受壓迫時皮疹更明顯

→皮疹是針頭大紅斑狀疹，壓迫時會消失

60 有關疱疹病毒的感染，下列何者錯誤？

(A) 嘴唇或嘴部周圍聚集成叢的水泡，常見於第一型疱疹病毒感染

(B) 疱疹性齦口炎是單純性疱疹初次侵犯兒童最常見的型態

(C) 使用 Acyclovir 可治療疱疹病毒的感染

(D) 疱疹性齦口炎的口腔潰瘍常見口腔的後半部，咽喉與咽喉上方

61 小華，9 個月，診斷為雙側中耳炎(Otitis Media)，有關中耳炎之臨床表徵，下列敘述何

者錯誤？

- (A) 頸淋巴結腫大
- (B) 抓或拉扯耳朵
- (C) 高燒
- (D) 吞困難

62 小名，3 歲，疑似罹患流行性感冒，有關臨床表徵的敘述，下列何者最不適當？

- (A) 發燒和發冷
- (B) 喉嚨痛和黏膜乾燥
- (C) 畏光和肌肉痠痛
- (D) 紅疹和皮膚搔癢

63 下列那種疾病不是由 A 群  $\beta$  型溶血性鏈球菌所引起？

- (A) 扁桃腺發炎
- (B) 急性風濕熱
- (C) 哮喘
- (D) 急性腎絲球腎炎

64 母親懷孕早期感染下列何種疾病，易導致新生兒罹患先天性心臟病？

- (A) 德國麻疹
- (B) 鏈球菌感染
- (C) 風濕性關節炎

(D)急性支氣管炎

65 菲菲，2 歲，罹患法洛氏四重症(Tetralogy of Fallot, TOF)，出院仍每 2 小服用毛地黃

(Digoxin)一次，下列護理指導何者錯誤？

(A)給藥前須完整測量心尖脈 1 分鐘

(B)最好是在飯前 1 小時或飯後 2 小時給藥

(C)勿將藥物與果汁混合餵食

(D)若忘記給藥超過 6 小時應補給一劑

66 小宇，10 歲，患有主動脈狹窄(Coarctation of the Aorta, COA)，入院時可能出現的臨

床表徵，下列敘述何者不適當？

(A)下肢比上肢血壓高 20mmHg

(B)股動脈搏動微弱

(C)主訴頭痛、暈眩

(D)主訴腳部冰冷

67 小美，17 歲女性，為 A 型血友病帶因者，到院做遺傳諮詢，下列敘述何者最適當？

(A)告知若配偶基因正常，未每一胎生男嬰有 1/2 機率為血友病者

(B)告知若配偶基因正常，則不會生下血友病的孩子

(C)告知若配偶基因正常，未來生的男嬰不會發生血友病，女嬰則有機率是帶因者

(D)告知若配偶基因正常，未來若生女嬰皆為帶因者但不會病

68 小華，3 歲，在一週前發燒後身上突然出現多處紫斑，經醫師診斷為特發性血小板

(Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, ITP)，下列敘述何者錯誤？

- (A)這是一種自體免疫的障礙
- (B)使用類固醇治療
- (C)指導家屬禁止使用阿斯匹靈藥物(Aspirin)
- (D)建議 3 歲前施行脾臟切除手術

69 小勇，10 歲，罹患急性淋巴性白血病，目前接受化學治療中，有關其護理措施之敘述，下列何者錯誤？

- (A) L-asparaginase 會引起血糖過高，需要監測血糖
- (B) Prednisolone 會增加感染機會，需採保護性隔離
- (C) Vincristine 需監測手腳麻刺感和便秘的現象
- (D) Mycostatin 指導於飯後使用，預防革蘭氏陽性菌感染

70 小軒，6 歲，體重 20 公斤，診斷為尿崩症，有關診斷與護理處置，下列何者錯誤？

- (A)在接受禁水試驗(fluid deprivate test)過程中，體重減少至 1 公斤時，繼續試驗
- (B)24 小時尿液分析之尿比重降低
- (C)當病況穩定後，可經由鼻腔噴霧法給予血管緊縮素，效果可維持 8~20 小時
- (D)避免過度給予血管緊縮素，造成尿量減少、體液滯留體內以及頭痛等症狀

71 罹患癌症之嬰幼兒，需要接受骨髓穿刺檢查，最常選擇的部位為何？

- (A)胸骨
- (B)股骨

(C)脛骨

(D)腰椎

72 第 1 型糖尿病(Type 1 diabetes)之敘述，下列何者正確？1.主要是因為自體免疫反應，使產生胰島素的  $\beta$  細胞受到破壞 2.使用口服降血糖藥物就能治療疾病 3.疾病治療的準則中，血糖監測、藥物、飲食和運動缺一不可 4.好發族群為肥胖之青少年

(A) 1.3.

(B) 1.4.

(C) 2.3.

(D) 2.4.

73 陳小弟，4 歲，身體瘦弱，因貧血來院檢查，疑似寄生蟲感染，陳小弟喜歡赤腳到田裡玩泥巴，下列何者是最可能感染的寄生蟲？

(A)蛔蟲

(B)蟯蟲

(C)鉤蟲

(D)廣東住血吸蟲

74 姍姍，2 歲 6 個月，因為出現水腫、體重增加而入院，診斷為腎病症候群(Nephrotic Syndrome)，有關此疾病的敘述下列何者最適當？

(A)一種因為 A 群  $\beta$  型溶血性鏈球菌感染所導致

(B)腎絲球受破壞，導致腎絲球膜通透性增加，常出現有蛋白尿

(C)主要治療以抗生素為主，應指導勿隨意停藥以免產生抗藥性

(D)容易出現有高血壓及嚴重血尿現象

75 小強，14 歲，因慢性腎衰竭進行腹膜透析治療中，有關護理指導的敘述，下列何者較不適當？

(A)攝取高熱量碳水化合物及脂肪類食物，特別限制蛋白質及鹽的攝取

(B)多攝取富含鐵質、葉酸食物以及提供維生素 D，防止出現貧血現象

(C)腹膜炎是常見的合併症，病童及家屬須學習透析部位正確消毒方法

(D)每次透析液約 30~50mL/kg 緩慢入腹內，停留 20 分鐘再引流出

76 有關先天性膽道閉鎖的敘述，下列何者正確？

(A)常出現水溶性維生素缺乏現象

(B)通常執行膽道切開術後，病童一般預後良好

(C)若未治療，易出現肝硬化、脾腫大現象

(D)糞便內經常含有血絲及暗紅色大便

77 使用格拉斯哥氏昏迷量表(Glasgow Coma Scale, GCS)評估兒童意識程度，下列敘述何者正確？

(A)評估嬰幼兒時，不需要父母陪同，避免干擾評估正確性

(B)評估兒童對於環境刺激的瞳孔、語言和運動反應

(C)少於或等於 7 分定義為昏迷狀態

(D)最高分 13 分表示正常

78 有關雷氏症候群(Reye's syndrome)的臨床表徵，下列敘述何者錯誤？

(A)肝臟酵素-胺基轉胺酶(AST、ALT)皆升高

(B)高血糖

(C)腦水腫

(D)凝血酶原時間(PT)及部分凝血酶原時間(PTT)延長

79 有關早產兒腦室內出血，下列護理處置之敘述，何者最適當？

(A)抬高床頭 45 度以減少顱內壓

(B)採取集中照護，減少不必要的打擾

(C)提供具聲光刺激的環境，增加大腦血流

(D)提供高張藥物及溶液，以減低大腦血流量

80 李小妹，診斷為痙攣型腦性麻痺(spastic type of cerebral palsy)有關其臨床表徵，下列敘述何者正確？

(A)不自主的扭動

(B)伸展反射增加

(C)肌腱反射降低

(D)跨大步伐行走